

## KULLANMA TALİMATI

**DIPROLENE Krem %0.05**  
**15 gram**  
**Deriye sürülerek kullanılır.**

**Etkin madde:** Betametazon dipropionat

**Yardımcı maddeler:** Titanyum dioksit, karboksipolimetilen, sodyum hidroksit, propilen glikol, saf su

**Bu ilacı kullanmadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.**

- *Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.*
- *Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*
- *Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.*
- *Bu ilacın kullanımı sırasında doktora veya hastaneye gittiğinizde bu ilacı kullandığınızı doktorunuza söyleyiniz.*
- *Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.*

### **Bu Kullanma Talimatında:**

1. **DIPROLENE nedir ve ne için kullanılır?**
2. **DIPROLENE kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler**
3. **DIPROLENE nasıl kullanılır?**
4. **Olası yan etkiler nelerdir?**
5. **DIPROLENE'nin saklanması**

**Başlıkları yer almaktadır.**

1. **DIPROLENE nedir ve ne için kullanılır?**

DIPROLENE yabancı madde içermeyen beyaz bir krem olup, 15 gramlık alüminyum tüplerde ambalajlanmıştır.

DIPROLENE, deri hastalıklarında kullanılan, kortizon-tipi bir hormon ilacıdır ve bu tip ilaçların güçlü olanlar grubunda yer alır.

DIPROLENE, sedef hastalığına ve kortizon-tipi ilaçlara yanıt veren diğer deri hastalıklarına eşlik eden iltihabın, kaşıntının ve rahatsızlığın giderilmesinde yardımcı olarak kullanılabilir.

## 2. **DIPROLENE kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler**

### **DIPROLENE 'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ**

Eğer,

- Betametazon dipropionata veya bu ilacın içindeki yardımcı maddelerden herhangi birine ya da diğer kortizon-tipi ilaçlara karşı duyarlı (alerjik) iseniz
- Derinizdesuçiçeği, uçuk gibi viral enfeksiyonlar varsa
- Derinizde mantar enfeksiyonu varsa
- Rozasea (yüzde görülen bir cilt hastalığı), akne, ağız etrafında dermatit, genital bölgede kaşıntı, pişik, zona veya diğer cilt enfeksiyonları varsa

### **DIPROLENE 'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ**

- Çocuklarda
- Bebeğinizi emziriyorsanız
- Hamile iseniz

“Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız”

#### **Hamilelik**

*İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*

Bu ilacın hamilelik sırasında kullanımıyla ilişkili bilgi yoktur. Eğer doktorunuz öneriyorsa; DIPROLENE'ni büyük miktarlarda ve uzun süreli kullanmayınız.

*Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz, hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*

#### **Emzirme**

*İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*

#### **Araç ve makine kullanımı**

Araç ve makine kullanma yeteneğini etkilemez.

#### **Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı**

Bu tip topikal ilaçlar deriden emilerek kana karışabildiklerinden, ağızdan veya enjeksiyonla kullanılan steroidlerin etkilerini güçlendirebilir.

*Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı (deri hastalıklarında kullanılanlar dahil) şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandıysanız, lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.*

## 3. **DIPROLENE nasıl kullanılır?**

### **Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar**

Günde iki kez sabah ve akşam veya doktorunuzun önerdiği şekilde kullanınız. Tedavi süresi, alınan yanıtı göre birkaç günle daha uzun süreler arasında değişebilir ama hastalık tekrar

değerlendirilmeden, 4 haftayı aşmamalıdır. İyileşme sağlandığında DIPROLENE Krem kullanımına son veriniz.

DIPROLENE'ni yüzünüze 5 günden fazla uygulamayınız.

DIPROLENE çocuklarda kullanılırken, vücudun herhangi bir bölgesine 5 günden daha uzun süre uygulanmamalıdır.

DIPROLENE 'ni gözünüze temas ettirmeyiniz.

#### **Uygulama yolu ve metodu**

DIPROLENE hasta bölgeyi tamamen kaplayacak ince bir tabaka halinde sürülerek kullanınız ve ovuşturularak deriye yediriniz. Her kullanım sonrasında ellerinizi sabunla iyice yıkayınız. Doktorunuz önermediği sürece, tedavi edilen deri bölgesini sargı ile ya da başka herhangi bir pansumanla kapatmayınız.

“Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır.”

#### **Değişik yaş grupları:**

**Çocuklarda kullanım:** Doktorunuz önermiyorsa 12 yaşın altındaki çocuklarda kullanmayınız.

*Eğer DIPROLENE'nin etkisinin çok güçlü ya da çok zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.*

#### **Kullanmanız gerekenden daha fazla DIPROLENE kullandıysanız:**

Bu ilacı kazara yutacak olursanız, derhal tıbbi yardımı arayın.

*Eğer DIPROLENE'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.*

#### **DIPROLENE kullanmayı unutursanız:**

DIPROLENE kullanmayı unutursanız, hatırlar hatırlamaz kullanınız, daha sonra tedavinize olağan şekilde devam ediniz.

*Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.*

#### **4. Olası yan etkiler nelerdir?**

Tüm ilaçlar gibi, DIPROLENE'nin içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır:

Çok yaygın : 10 hastanın en az 1 inde görülebilir .

Yaygın : 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

Yaygın olmayan : 100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilir.

Seyrek : 1.000 hastanın birinden az görülebilir.  
Çok seyrek : 10.000 hastanın birinden az görülebilir.

**Deri ve deri altı doku hastalıkları:**

*Çok yaygın :* Deride yanma ve iğnelenme hissi, deride kuruluk, kaşıntı, tahriş

*Seyrek:* Deride karıncalanma, iğnelenme hissi, deride gerilme veya çatlama, sıcaklık hissi, tabaka halinde ve lezyon çevresinde pullanma, döküntü, deride incelme, kızarıklık, deride ince damarlanmalar

*Çok seyrek:* Deride kaşıntı, kıl dibi iltihabı, kıllanmada artma, sivilce benzeri oluşumlar, deri renginde azalma, ağız çevresinde iltihap, temasla ortaya çıkan deri iltihabı, derinin yumuşaması, infeksiyon gelişimi, deride çatlaklar, terlemeye bağlı döküntüler

*Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız, doktorunuzu ya da eczacınızı bilgilendiriniz.*

Bu ilacı kullanan çocuklar ve ergenler, ilacın deriden emilebilmesi ve büyümeyi etkileyebilmesi ya da istenmeyen başka etkilere yol açabilmesi nedeniyle, doktorları tarafından yakından izlenmelidir.

**5. DIPROLENE 'nin saklanması**

*Çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.*

30 °C' nin altındaki oda sıcaklığında, orijinal ambalajında saklayınız.

**Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.**

*Kutunun ve tüpün üzerinde belirtilen son kullanma tarihinden sonra DIPROLENE'ni kullanmayınız.*

*"Eğer ambalajın hasar gördüğünü farkederseniz DIPROLENE'ni kullanmayınız".*

**Ruhsat Sahibi:**

Merck Sharp Dohme İlaçları Ltd. Şti.  
Esentepe-İstanbul

**Üretim Yeri:**

Zentiva Sağlık Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.  
Küçükkarıştıran 39780, Lüleburgaz/Kırklareli

*Bu kullanma talimatı .../.../... tarihinde onaylanmıştır.*