

## KULLANMA TALİMATI

**EDRONAX® 4 mg Tablet**  
Ağızdan alınır.

- **Etkin madde:** Her tablet 5.224 mg reboksetin metansülfonat (4 mg reboksetin baza eşdeğer) içerir.
- **Yardımcı maddeler:** Mikrokrystalin selüloz, dibazik kalsiyum fosfat dihidrat, krospovidon (PVP-çapraz bağlı), silikon dioksit, magnezyum stearat.

**Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.**

- *Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.*
- *Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*
- *Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.*
- *Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.*
- *Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.*

### **Bu Kullanma Talimatında:**

1. **EDRONAX nedir ve ne için kullanılır?**
2. **EDRONAX'ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler**
3. **EDRONAX nasıl kullanılır?**
4. **Olası yan etkiler nelerdir?**
5. **EDRONAX'ın saklanması**

**Başlıkları yer almaktadır.**

#### **1. EDRONAX nedir ve ne için kullanılır?**

EDRONAX tablettir, 60 tablet içeren blister ambalajlarda bulunur.

EDRONAX'taki etkin maddesi reboksetin, antidepresanlar olarak adlandırılan bir ilaç grubuna aittir. EDRONAX, şiddetli ruhsal çökkünlük hissinin (major depresyon) başlangıç (akut) tedavisinde ve başlangıçta reboksetinle tedaviye yanıt vermeniz durumunda belirtilerinizin iyileşmesini sürdürmek için kullanılır.

#### **2. EDRONAX'ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler**

**EDRONAX'ı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ**

Eğer,

- Reboksetine veya EDRONAX'ın diğer bileşenlerinden herhangi birine karşı alerjik (aşırı duyarlı) iseniz.

## **EDRONAX'ı ařađıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ**

EDRONAX gibi antidepresan ilaların ocuklar ve 24 yařına kadar olan genlerdeki kullanımlarının intihar dūřuncesi ya da davranıřlarını artırma olasılıđı bulunmaktadır. Bu nedenle zellikle tedavinin bařlangıcı ve ilk aylarında, ila dozunun arttırılma/azaltılma ya da kesilme dnemlerinde huzursuzluk, ařırı hareketlilik gibi beklenmedik davranıř deđiřiklikleri ya da kendinize zarar verme isteđi hissederseniz hemen doktorunuza ya da ailenize bildiriniz veya size en yakın hastaneye bařvurunuz. EDRONAX, 18 yařın altındaki ocukların ve adolesanların tedavisinde kullanılmamalıdır.

Eđer,

- Kasılmalar oluřursa veya sara nbeti geirirseniz tedaviyi durdurunuz. Daha nceden sizde nbet yküsü varsa bu ilacı ok dikkatle kullanmalısınız.
- İdrar tutulumu ile ilgili sorunlar, prostat byumesi veya kalp sorunları gemiřiniz varsa.
- Kan basıncınızı dūřrmek iin ila kullanıyorsanız.
- Karaciđer veya bbrek sorunlarınız varsa. Doktorunuzun, ilacınızın dozunu ayarlaması gerekebilir.
- Depresyon iin MAO inhibitrleri (moklobemid), trisiklikler (amitriptilin, nortriptilin, klomipramin), nefazodon, SSRI'lar (fluvoksamin, sertralin, fluoksetin, sitalopram, essitalopram, paroksetin) veya lityum gibi bařka herhangi bir ila kullanıyorsanız.
- Linezolid (bir antibiyotik) veya metilen mavisi gibi bařka MAO inhibitrleri kullanıyorsanız. (Diđer ilalar ile birlikte kullanımı blmne bakınız)
- Mani (ařırı aktif davranıř veya dūřunceler) epizodları geirdiyseniz.
- Glokomun (gz ii basıncında artıř) bazı eřitleri gibi bir gz hastalıđınız varsa

İntihar dūřunceleri ve depresyonunuzun ktleřmesi:

Depresyondaysanız, bazen kendinize zarar verme veya intihar etme dūřunceleriniz olabilir. Tm antidepresanların etki gstermesi zaman aldıđı iin (genellikle iki hafta, ancak bazen daha uzun bir sre) bu dūřunceler antidepresanlara ilk bařladıđınızda artıř gsterebilir.

Bu dūřüncelere ařađıdaki durumlarda daha eđilimli olabilirsiniz:

Daha nce intihar etme veya kendinize zarar verme dūřunceleriniz olduysa.

Gen yetiřkinseniz. Klinik arařtırmalardan elde edilen bilgiler, psikiyatrik rahatsızlıkları olan ve bir antidepresanla tedavi edilen 25 yařın altındaki yetiřkinlerde intihar davranıřı riskinin daha yksek olduđunu gstermektedir.

Herhangi bir zamanda kendinize zarar verme ve intihar etme dūřunceleriniz olursa, hemen doktorunuza bařvurunuz veya hastaneye gidiniz.

Depresyon geirdiđinizi herhangi bir akrabınıza veya yakın arkadařınıza anlatmanız ve onlardan bu kullanma talimatını okumalarını istemeniz yararlı olabilir. Onlardan depresyonunuzun ktye gittiđini dūřnmeleri veya davranıřlarındaki deđiřikliklerden endiřelenmeleri durumunda bunu size sylemelerini isteyiniz.

Çocuklarda ve ergenlerde kullanım:

EDRONAX, 18 yaşın altındaki çocuklarda ve ergenlerde kullanılmamalıdır. Bu ilaç sınıfıyla tedavi edilen 18 yaşın altındaki hastalarda intihar girişimi, intihar düşünceleri ve düşmanca tutum (çoğunlukla agresiflik, zıtlama davranışı ve kızgınlık) gibi istenmeyen etkilerin görülme riski daha yüksektir.

Aynı zamanda, EDRONAX'ın bu yaş grubunda büyüme, olgunlaşma, zihinsel ve davranışsal gelişime ilişkin uzun süreli güvenliliği henüz kanıtlanmamıştır.

EDRONAX'ın yaşlı hastalarda kullanımını, yeterli deneyimin bulunmaması nedeniyle önerilmez.

Yaşlı hastaların uzun süreli tedavisinde reboksetinle ilgili klinik deneyim şu anda sınırlıdır. Bu hastalarda, 14. haftadan itibaren ortalama potasyum düzeylerinde düşüş görülmüştür ve potasyum düzeyleri hiçbir zaman normal sınırların altına inmemiştir.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

#### **EDRONAX'ın yiyecek ve içecek ile kullanılması**

EDRONAX aç veya tok alınabilir.

#### **Hamilelik**

*İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*

Hamilelerde EDRONAX kullanımına ilişkin yeterli deneyim bulunmamaktadır. Hamileyseniz, doktorunuz dikkatli bir klinik risk/fayda değerlendirmesinin ardından kesinlikle gerekli olduğuna karar vermediği sürece EDRONAX kullanmayınız. Hamileyseniz veya hamile kalmayı planlıyorsanız, bunu doktorunuza hemen bildirin.

*Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*

#### **Emzirme**

*İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*

EDRONAX, anne sütüne küçük miktarlarda geçer. Bebek üzerinde potansiyel etki riski vardır. Bu nedenle, konuyu doktorunuzla görüşmeniz gerekir. Doktorunuz, emzirmeyi mi, yoksa EDRONAX tedavisini mi sonlandırmanız gerektiğine karar verecektir.

#### **Araç ve makine kullanımı**

Araç veya makine kullanırken dikkatli olunması önerilir.

EDRONAX'ın sizi etkilemediğinden (örneğin uyuşuk hissetme) ve araç/makine kullanımının güvenli olduğundan emin oluncaya kadar araç veya makine kullanmamalısınız.

#### **Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı**

EDRONAX'ın diğer ilaçlarla etkileşime girebileceği göz önünde bulundurulduğunda, şu ilaçları kullanıyorsanız doktorunuza bilgilendiriniz:

- Mantar enfeksiyonları için kullanılan bazı ilaçlar (örnek ketokonazol)

- Eritromisin, rifampisin gibi belirli antibiyotikler
- Migren (ergotamin) veya Parkinson hastalığı (kabergolin) tedavisinde kullanılan, ergot türevleri olarak adlandırılan ilaçlar (MAO inhibitörleri (moklobemid), trisiklikler (amitriptilin, nortriptilin, klomipramin), nefazodon, SSRI'lar (fluvoksamin, sertralin, fluoksetin, sitalopram, essitalopram, paroksetin gibi) veya lityum gibi belirli antidepresanlar
- Linezolid (bir antibiyotik) ve metilen mavisi (kanda yüksek methemoglobin seviyesini tedavi etmek için kullanılır) gibi diğer MAO inhibitörleri
- Potasyum kaybına neden olan tüm diüretikler (idrar söktürücüler), örn. tiazidler
- Karbamazepin, fenobarbital, fenitoin gibi epilepsi tedavisinde kullanılan ilaçlar,
- Sarı kantaron (St. John's Wort) içeren bitkisel ürünler

Doktorunuz EDRONAX'ı diğer ilaçlarla kullanıp kullanamayacağınızı belirtecektir.

*Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.*

### 3. EDRONAX nasıl kullanılır?

- **Uygun kullanım ve doz/ uygulama sıklığı için talimatlar:**

Yetişkinler için normal doz günde 8 mg'dır (günde iki kez 4 mg'lık tablet). İlaça verdiğiniz yanıtı bağlı olarak, 3 ila 4 hafta sonra doktorunuz gerekirse dozu günde 10 mg'a kadar artırmayı söyleyebilir. Günlük maksimum doz 12 mg'ı geçmemelidir. Klinik etkililik, tedaviye başladıktan yaklaşık 14 gün sonra görülür.

EDRONAX'ı her zaman tam olarak doktorunuzun size söylediği şekilde alınız. Emin değilseniz, doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Diğer antidepresan ilaçlar gibi EDRONAX da semptomlarınızı hemen hafifletmeyecektir. Kendinizi ancak birkaç hafta sonra daha iyi hissetmeye başlayabilirsiniz.

Kendinizi daha iyi hissetseniz bile, doktorunuz ilacınızı kesmenizi söyleyinceye kadar kullanmaya devam etmeniz önemlidir. Tabletleri kullanmayı zamanından önce bırakırsanız, semptomlarınız tekrar ortaya çıkabilir.

- **Uygulama yolu ve metodu:**

Ağızdan alınır.

Günlük doz, biri sabah, diğeri akşam olmak üzere ikiye bölünerek alınmalıdır. Tabletini bir bardak suyla yutmalısınız. Tableti çiğnememelisiniz.

EDRONAX almayı hatırlamanıza yardımcı olması için, tabletlerinizi her gün aynı saatte almayı düşünebilirsiniz.

- **Değişik yaş grupları:**

- **Çocuklarda kullanımı:**

EDRONAX, 18 yaşın altında kullanılmamalıdır.

- **Yaşlılarda kullanımı:**

EDRONAX'ın yaşlı hastalarda kullanımı, yeterli deneyimin bulunmaması nedeniyle önerilmez.

- **Özel kullanım durumları:**

**Böbrek ve karaciğer yetmezliği:**

Böbrek veya karaciğer fonksiyonu yetersiz olan hastalarda, başlangıç dozu günde 4 mg'dır. Bu, kişinin ilaca verdiği yanıtı bağlı olarak artırılabilir.

*Eğer EDRONAX'ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.*

**Kullanmanız gerekenden daha fazla EDRONAX kullandıysanız:**

Kesinlikle doktorunuzun önerdiğinden fazla tablet almamısınız. Çok fazla tablet alırsanız, hemen doktorunuza veya en yakın hastaneye başvurunuz. Almanız gerekenden fazla EDRONAX alırsanız, düşük veya yüksek kan basıncı, kaygı ve endişe gibi doz aşımı belirtileri yaşayabilirsiniz.

*EDRONAX'tan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.*

**EDRONAX'ı kullanmayı unutursanız:**

EDRONAX almayı unutursanız, bir sonraki dozu normal saatinde alınız.

*Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.*

**EDRONAX ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler:**

Semptomlar tekrar ortaya çıkabileceği için, doktorunuza danışmadan ilaç kullanımını kesmemeniz gerekir.

EDRONAX tedavisini kesmeniz durumunda baş ağrısı, baş dönmesi, sinirlilik hali ve bulantı dahil olmak üzere, ilacın kesilmesiyle ilişkili az sayıda belirti oluşabilir.

**4. Olası yan etkiler nelerdir?**

Tüm ilaçlar gibi, EDRONAX'ın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı kişilerde yan etkiler olabilir.

EDRONAX'ın yan etkilerinin çoğu hafiftir ve genellikle tedavinin ilk birkaç haftasından sonra kaybolur.

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sınıflandırılmıştır:

Çok yaygın	:10 hastanın en az birinde görülebilir .
Yaygın	:10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.
Yaygın olmayan	:100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilir.
Seyrek	:1.000 hastanın birinden az, fakat 10000 hastanın birinden fazla görülebilir.
Çok seyrek	:10.000 hastanın birinden az görülebilir.
Bilinmiyor	: Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

**Çok yaygın yan etkiler**

- Uyuma güçlükleri (uykusuzluk)

- Ağız kuruluđu
- Kabızlık
- Bulantı
- Aşırı terleme (hiperhidroz)
- Baş dönmesi hissi

#### **Yaygın yan etkiler**

- Baş ağrısı
- Parestezi (uyuşma), sabit oturmakta veya ayakta durmada zorluk
- Huzursuzluk, kaygı, endişe
- Kalp atış hızında artış, palpasyon (kalp çarpıntısı)
- Kan damarlarında genişleme, ayağa kalkarken kan basıncında ani düşme, kan basıncında artış
- Kusma
- Döküntü
- Görsel uzak-yakın odaklanma eksikliği
- İştah eksikliği veya iştah kaybı
- Mesanenin tamamen boşalmaması hissi veya yavaş bir şekilde boşalması, idrar yolu enfeksiyonu, idrar yaparken ağrı, mesanenin tam boşaltılmaması
- Erkeklerde ereksiyon bozuklukları, boşalma sırasında testislerde ağrı, geç boşalma
- Ürperme
- Yerinde duramama (akatizi)

#### **Yaygın olmayan yan etkiler**

- Göz bebeklerinin genişlemesi
- İç kulaktan kaynaklanan baş dönmesi (vertigo)

#### **Seyrek yan etkiler**

- Glokom (göz içi basıncında artma )

#### **Pazarlama sonrası görülen yan etkiler:**

- Kanda sodyum düzeyinin normalin altına düşmesi (hiponatremi)
- Hayal görme
- Kol ve bacaklarda soğukluk
- Testislerde ağrı
- Sinirlilik
- Raynaud sendromu adı verilen bir dolaşım bozukluğu
- Saldırgan davranış
- Alerjik deri iltihabı veya döküntüsü
- Göz içi basıncında artış
- İntihar düşüncesi veya girişimi

İntihar düşüncesi veya girişimi reboksetin tedavisi sırasında ya da tedavi bırakıldıktan kısa bir süre sonra bildirilmiştir (EDRONAX'ı aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ bölümüne bakınız).

Reboksetin tedavisi sırasında veya tedavinin kesilmesinden hemen sonra intihar düşüncesi veya intihar davranışı vakaları rapor edilmiştir.

*Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.*

#### Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri [www.titck.gov.tr](http://www.titck.gov.tr) sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi’ne (TÜFAM) bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

#### **5. EDRONAX’ın saklanması**

*EDRONAX’ı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.*

25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

**Son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız.**

*Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra EDRONAX’ı kullanmayınız.*

**Ruhsat Sahibi:** PFIZER İlaçları Ltd. Şti. 34347 Ortaköy –İstanbul

**Üretici:** Pfizer Italia S.r.l., 63046 Marino Del Tronto, Ascoli Piceno - İtalya

*Bu kullanma talimatı..... tarihinde onaylanmıştır.*