

## KULLANMA TALİMATI

### FERİFER-40 Oral Çözelti, 40 mg/5 ml

Ağız yolu ile kullanılır.

**Etkin madde:** Her bir kaşık (5 ml) solüsyon, 40 mg demir (demir III polimaltoz kompleksi halinde) içerir.

**Yardımcı maddeler:** Sorbitol (E420), sukroz, metil paraben sodyum (E219), propil paraben sodyum (E217), sitrik asit, vanilya esansı ve deiyonize su.

**Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz. Çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.**

- Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
- Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
- Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
- Bu ilacın kullanımı sırasında doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz
- Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında **yüksek veya düşük** doz kullanmayınız.

#### **Bu Kullanma Talimatında:**

- 1- **FERİFER-40 nedir ve ne için kullanılır?**
- 2- **FERİFER-40' ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler**
- 3- **FERİFER-40 nasıl kullanılır?**
- 4- **Olası yan etkiler nelerdir?**
- 5- **FERİFER-40'ın saklanması**

**Başlıkları yer almaktadır.**

#### **1 – FERİFER-40 nedir ve ne için kullanılır?**

FERİFER-40, alüminyum ile kapatılmış PET/PE kaşıklarda, her bir kaşıқта (5 ml) 40 mg demir (demir III polimaltoz kompleksi halinde) içeren oral solüsyondur.

Her bir kutuda; her biri bir kullanımlık, şeffaf OPP poşet ile ambalajlanmış (5 ml) 10 veya 30 kaşık bulunur.

Değişik kökenli tüm demir eksiklikleri ile demir eksikliği anemisinin tedavi ve profilaksisinde; hamilelik, laktasyon ve çocukluk döneminde demir desteği tedavisinde kullanılır.

Hamilelikte demir desteği ile birlikte folik asit takviyesi de göz önünde bulundurulmalıdır.

#### **2 – FERİFER-40'ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler**

**FERİFER-40'ı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ:**

- Eğer sizde demir yüklenmesi (hemokromatozis, hemosideroz) varsa
- Eğer demire karşı aşırı duyarlılığınız var ise
- Eğer demir kullanımı bozukluğunuz (kurşun anemisi, sidero-akrestik anemi) ve ‘‘Akdeniz Anemisi’’(talasemi) hastalığınız var ise

- Eđer demir eksikliđine bađlı olmayan aneminiz (hemolitik anemi) varsa;
- Demir eksikliđinin neden olmadıđı aneminiz (B12 vitamini eksikliđine bađlı megaloblastik anemi, hemolitik anemi) varsa;
- Düz enli olarak devamlı kan nakli yapılıyorsa;
- HIV enfeksiyonunuz varsa;
- Demir eksikliđiniz klinik olarak kesinleřtirilmemiřse kullanmayınız.

### **FERİFER-40'ı ařađıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ**

Eđer;

- Eđer alerjik durumunuz varsa;
- Mide ülseriniz varsa doktor kontrolünde kullanınız.

Bu uyarılar, geçmiřteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danıřınız.

### **FERİFER-40'ın yiyecek ve iecek ile kullanılması:**

Yiyecek ve ieceklerle etkileřimi yoktur.

### **Hamilelik:**

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danıřınız.

FERİFER-40 hamilelikte demir desteđi olarak kullanılabilir.

Tedaviniz sırasında hamile olduđunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danıřınız.

### **Emzirme**

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danıřınız.

FERİFER-40 emzirme döneminde kullanılabilir. Süte getiđinden doktorunuzun önerdiđi řekli ile kullanınız.

### **Ara ve makine kullanımı**

Ara ve kullanımı üzerinde hibir etkisi yoktur.

### **FERİFER-40'ın ieriđinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler**

İeriđinde bulunan sorbitol ve sukroz nedeniyle, daha önceden doktorunuz tarafından bazı řekerlere karřı dayanıksızlıđınız olduđu söylenmiřse FERİFER-40'ı almadan önce doktorunuzla temasa geiniz.

İerdiđi sodyum metil paraben ve propil paraben nedeniyle, alerjik reaksiyonlara (muhtemelen gecikmiř) sebebiyet verebilir.

Bu tıbbi ürün her 5 ml' sinde 1.27 mg sodyum ihtiva eder. Bu durum kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.

### **Diđer ilalar ile birlikte kullanımı**

Demir (III) Hidroksit Polimaltoz Kompleksi besinler ve birlikte uygulanan ilalarla (tetrasiklinler, antiasitler) iyonik bir etkileřim yapmaz.

C vitamininin demir emilimini artırdıđı bilinmektedir.

*Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandıysanız lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.*

### **3 - FERİFER-40 nasıl kullanılır?**

#### **Uygun kullanım ve doz / uygulama sıklığı için talimatlar:**

FERİFER-40 yetişkinlerde 1 veya 2 kaşık, tercihen yemeklerden önce alınır.

Gebelik ve emzirme sırasında kullanımında sakıncası yoktur.

Hekiminizin önereceği süre kadar kullanılmalıdır (ortalama 2-3 ay).

Demir eksikliği belirtilerinin ortadan kalkmasından sonra vücudun demir depolarının dolması için en az bir ay daha kullanılmalıdır.

#### **Uygulama yolu ve metodu:**

FERİFER-40 ağızdan kullanım içindir.

FERİFER-40 direkt olarak kaşıktan içilir.

#### **Değişik yaş grupları:**

##### **Çocuklarda kullanım:**

Doktorun önerisine göre tercihen yemeklerden önce bir kaşık kullanılır.

##### **Yaşlılarda kullanımı:**

Yaşlılarda kullanımı aynen erişkinlerdeki gibidir.

#### **Özel kullanım durumları**

**Böbrek/Karaciğer yetmezliği:** Ciddi böbrek ve karaciğer yetmezliği olanlarda incelenmemiştir.

*Eğer FERİFER-40'ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.*

#### **Kullanmanız gerekenden fazla FERİFER-40 kullandıysanız:**

**FERİFER-40'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.**

Kullanmanız gerekenden daha fazla FERİFER-40 kullandıysanız; bulantı, kusma, karın ağrısı, ishal görülebilir. Sersemlik, renk solukluğu veya siyanoz, hatta şok gelişebilir. Hastanın kusturulması ve/veya midesinin yıkanması gerekebilir. Zehirlenme üzerinden zaman geçmiş ise vücuttaki fazla demiri bağlayacak desferrioksamin gibi bir ilaç kullanılabilir.

FERİFER-40'ın yanlışlıkla 6 yaşın altındaki çocuklar tarafından kullanılması ölümcül zehirlenmelere yol açar. Bu nedenle FERİFER-40 şurubu, çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayınız. Aşırı dozda alınması durumunda derhal doktorunuzu ya da Ulusal Zehir Danışma Merkezi (UZEM)'ni arayınız.

#### **FERİFER-40'i kullanmayı unutursanız:**

*Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.*

Unutulan dozu atlayınız ve bir sonraki dozu almanız gereken saatte alınız.

### **FERİFER-40 ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler:**

Bulunmamaktadır.

#### **4 - Olası yan etkiler nelerdir?**

Tüm ilaçlar gibi, FERİFER-40'ın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

**Aşağıdakilerden biri olursa, FERİFER-40'ı kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz.**

- Eller, ayaklar, bilekler, yüz, dudakların şişmesi ya da özellikle ağız veya boğazın yutmayı veya nefes almayı zorlaştıracak şekilde şişmelerinde
- Şiddetli cilt döküntüsü
- Baygınlık

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin FERİFER-40'a karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

**Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz.**

- Göğüste ya da boğazda ağrı (özellikle yutarken)
- Kanlı dışkı (kırmızı ya da siyah renk)

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

**Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz doktorunuza söyleyiniz:**

- Mide bulanması
- İshal
- Kusma
- Kabızlık
- Midede şişkinlik
- Barsak ve mide tahrişi

Bunlar FERİFER-40'ın hafif yan etkileridir.

Bu yan etkiler doz azaltıldığında veya tedavi kesildiğinde kaybolur.

*Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.*

#### **5 – FERİFER-40'ın Saklanması**

FERİFER-40'ı çocukların göremeyeceği ve erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 25°C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

**Son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız.**

FERİFER-40'ı etiketin veya ambalajın üzerinde belirtilen son kullanma tarihinden önce kullanınız.

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz FERİFER-40'ı kullanmayınız.

**Ruhsat Sahibi:** Berko İlaç ve Kimya San.A.Ş.

Adres: Yenişehir Mah. Özgür Sok. No: 16 Ataşehir/İstanbul

Telefon: 0216 456 65 70 Pbx

Faks: 0216 456 65 79

e-mail: [info@berko.com.tr](mailto:info@berko.com.tr)

**Üretici:** Berko İlaç ve Kimya San.A.Ş.

Adres: Adil Mah. Beykoz Cad. Tanıdık Sok. No: 1 Sultanbeyli/ İstanbul

Telefon: 0 216 592 33 00

Faks: 0 216 592 00 62

Bu kullanma talimatı 24/02/2011 tarihinde onaylanmıştır.