

KULLANMA TALİMATI

LEVOSOL 30 mg/5 ml Şurup

Ağızdan alınır.

- **Etkin madde:** 1 ml'de 6 mg levodropropizin içerir.
- **Yardımcı maddeler:** Sakkaroz, metil parahidroksi benzoat, propil parahidroksi benzoat, sodyum hidroksit, sitrik asit monohidrat, kiraz aroması ve saf su.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

- *Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.*
- *Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*
- *Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.*
- *Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.*
- *Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.*

Bu Kullanma Talimatında:

1. *LEVOSOL nedir ve ne için kullanılır?*
2. *LEVOSOL'ü kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler*
3. *LEVOSOL nasıl kullanılır?*
4. *Olası yan etkiler nelerdir?*
5. *LEVOSOL'ün saklanması*

Başlıkları yer almaktadır.

1. LEVOSOL nedir ve ne için kullanılır?

LEVOSOL, 150 ml'lik, şişede, 5 ml'lik işaretli ölçek ile beraber sunulan şuruptur.

LEVOSOL, etkin madde olarak levodropropizin içerir.

Çeşitli nedenlere bağlı kuru öksürüğün (balgamsız öksürük) giderilmesinde kullanılır.

2. LEVOSOL'ü kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

LEVOSOL'ü aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

- Levodropropizine veya LEVOSOL'ün bileşenlerine karşı alerjiniz varsa,
- Hamileyseniz ya da emziriyorsanız,
- Ağır karaciğer bozukluğunuz varsa,
- Balgam çıkarmakta zorlanıyorsanız

LEVOSOL'ü ařağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

- Ciddi böbrek yetmezliđiniz var ise hekiminize danıřmadan LEVOSOL'ü kullanmayınız.
- Diyabetiniz (řeker hastalıđınız) var ise, hekiminize danıřmadan LEVOSOL'ü kullanmayınız.

Öksürük ilaçları altta yatan hastalıđın tedavisi sađlanıncaya kadar ve/veya öksürüđü tetikleyici neden tespit edilinceye kadar kullanılmalıdır.

Bu uyarılar geđmiřteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geđerliyse lütfen doktorunuza danıřınız.

LEVOSOL'ün yiyecek ve iecek ile kullanılması

LEVOSOL'ün besinlerle birlikte alınmasının emilim üzerinde herhangi bir etkisi olduđu yönünde bir bilgi olmamakla beraber, ilacın yemeklerden bir süre önce veya sonra alınması önerilir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danıřınız.

LEVOSOL plasenta bariyerini geđtiđi için bebeđinize zarar verebilir, bu nedenle kullanmayınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduđunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danıřınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danıřınız.

LEVOSOL anne sütüne geđer, bu nedenle emzirirken kullanmayınız.

Ara ve makine kullanımı

Uyku haline neden olabileceđi için ara veya herhangi bir makine kullanırken çok dikkatli olmalısınız.

LEVOSOL'ün ieriđinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Eđer daha önceden doktorunuz tarafından bazı řekerlere karřı intoleransınız (dayanıksızlıđınız) olduđu söylenmiřse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geiniz.

Alerjik reaksiyonlara (muhtemelen gecikmiř) sebebiyet verebilir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Her ne kadar klinik çalışmalar süresince benzodiazepinler (sakinleştirici uyku ilaçları) ile levodropropizin arasında bir etkileşim gözlenmemişse de, özellikle sedatif (sakinleştirici) ilaç alan duyarlı hastalarda kullanırken dikkatli olunması gerekir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. LEVOSOL nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Doktor tarafından başka bir şekilde tavsiye edilmediği takdirde belirtilen dozlarda kullanınız. LEVOSOL erişkinlerde günde 3 kez ve en az 6'sar saat ara ile 10 ml (60 mg) şurup (2 ölçek) şeklinde uygulanır.

İlaç; maksimum 7 günlük tedavi dönemini aşmamak kaydı ile, öksürük kaybolana kadar yada bir doktorun tavsiyesine göre alınmalıdır. Eğer belirtiler bu dönem içinde kaybolmazsa ilacın kullanımına geçici olarak ara verilmeli ve bir doktora danışılmalıdır.

Uygulama yolu ve metodu:

LEVOSOL'un besinlerle birlikte alınmasının emilim üzerinde herhangi bir etkisi olduğu yönünde bir bilgi olmamakla beraber, ilacın yemeklerden bir süre önce veya sonra alınması önerilir.

LEVOSOL sadece ağızdan kullanım içindir.

Ölçek kaşığı kullanılarak şurup içilir.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

2 yaşından büyük çocuklarda kullanılır.

3 eşit doza bölünerek en az 6'sar saat ara ile semptomların şiddetine göre günde kilogram başına 3-6 mg şeklinde uygulanır.

10-20 kg arasındaki çocuklara günde 3 defa 3 ml (ölçekteki 3 ml çizgisine kadar)

20-30 kg arasındaki çocuklara günde 3 defa 5 ml (tam dolu 1 ölçek)

30 kg'ın üstündeki çocuklara günde 3 defa 10 ml (tam dolu 2 ölçek) şeklinde uygulanır.

Yaşlılarda kullanımı:

LEVOSOL dozu yaşlı hastalarda dikkatle saptanmalıdır.

Özel kullanım durumları:

Böbrek/Karaciğer yetmezliği

Ciddi böbrek ve karaciğer yetmezliği vakalarında; fayda-risk oranı göz önüne alınarak kullanılmalıdır.

Eğer LEVOSOL'ün etkisinin çok güçlü ya da çok zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden fazla LEVOSOL kullandıysanız :

LEVOSOL'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

LEVOSOL'ü kullanmayı unutursanız:

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

LEVOSOL ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler:

Bulunmamaktadır.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, LEVOSOL'ün içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa LEVOSOL kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz

Soluk almada zorluk, yüz, dudak, dil veya boğazda şişme, ani kan basıncı düşmesi, yaygın ve şiddetli kızarıklık, kaşıntı, ürtiker (kurdeşen)

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin LEVOSOL'e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz

- Bulantı-kusma
- Hazımsızlık
- Midede yanma hissi
- İshal
- Dil iltihabı, ağız yaraları
- Halsizlik-Yorgunluk-Uyuşukluk
- Titreme

- Bař ađrısı
- Bař dđnmesi
- arpıntı
- Kalp atımının hızlanması
- Asabiyet, uyku hali, benlik kaybı

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Ařađıdakilerden herhangi birini fark ederseniz doktorunuza söyleyiniz

- Alerjik deri reaksiyonları (kızarıklık, kaşıntı).

Bunlar LEVOSOL'ün hafif yan etkileridir.

Eđer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

5. LEVOSOL'ün saklanması :

LEVOSOL'ü çocukların göremeyeceđi, erişemeyeceđi yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25°C'nin altındaki oda sıcaklığında, ışıktan koruyarak saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra LEVOSOL'ü kullanmayınız.

Ruhsat sahibi : KOAK FARMA İla ve Kimya Sanayi A.ř.
Bađlarbaşı, Gazi Cad., No:40 Üsküdar / İstanbul

İmal yeri : KOAK FARMA İla ve Kimya Sanayi A.ř.
Organize Sanayi Bölgesi erkezköy / Tekirdađ

Bu kullanma talimatı 12/03/2012 tarihinde onaylanmıřtır.