

KULLANMA TALİMATI

MEBUCAIN 2 mg/1 mg naneli pastil

Ağız yoluyla alınır.

- **Etkin madde:** Her bir pastil 2 mg setilpiridinyum klorür ve 1 mg lidokain hidroklorür içerir.
- **Yardımcı maddeler:** Nane yağı, levomentol, asesulfam potasyum, mısır nişastası, sitrik asit monohidrat, makrogol, mikrokristalin selüloz, magnezyum stearat, sorbitol (E420), saf su

Bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu ilaç sizin reçetesiz olarak temin edip bir doktor yardımı almadan eczacınızın tavsiyesi ile hafif bir hastalığı tedavi etmeniz içindir. Buna karşın, yine de MEBUCAIN'den en iyi sonuçları alabilmeniz için dikkatli kullanmanız gerekmektedir.

- *Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.*
- *Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*
- *Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.*
- *Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.*
- *Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında **yüksek veya düşük** doz kullanmayınız.*

Bu Kullanma Talimatında:

1. **MEBUCAIN nedir ve ne için kullanılır?**
2. **MEBUCAIN'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler**
3. **MEBUCAIN nasıl kullanılır?**
4. **Olası yan etkiler nelerdir?**
5. **MEBUCAIN'in saklanması**

Başlıkları yer almaktadır.

1. **MEBUCAIN nedir ve ne için kullanılır?**

- MEBUCAIN etkin madde olarak setilpiridinyum ve lidokain HCl içeren, pastil formunda bir üründür.
- MEBUCAIN boğaz preparatları olarak adlandırılan ilaç grubunun antiseptikler ve anestezipler sınıfına dahil bir üründür.
- MEBUCAIN 20 adet pastil içeren blister ambalajlarda, orijinal karton kutuda kullanıma sunulmaktadır.
- MEBUCAIN,
 - Lokal antiseptik (bölgesel etkili mikrop öldürücü) ve ağrı kesici etkisiyle, boğaz ağrısında, ağız ve boğazın minör enfeksiyonlarında tedaviye yardımcı olarak, ağrı ve tahrişin giderilmesinde kullanılır.
- MEBUCAIN iki dakika içerisinde boğaz ağrısını azaltmaya başlar.

2. **MEBUCAIN’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler**

MEBUCAIN’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer:

- Etkin maddelere veya amid çeşidi diğer lokal anesteziplere veya yardımcı maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılığınız var ise

MEBUCAIN’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer:

- Birkaç gün süren boğaz ağrınız ve ateşiniz varsa, MEBUCAIN kullanmadan önce lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
- MEBUCAIN kullanımınızla 5 gün sonra şikayetleriniz devam eder veya belirtilere yüksek ateş, baş dönmesi veya kusma eşlik ederse doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
- MEBUCAIN’i belirtiler sürerken ardarda en fazla 5 gün kullanınız.
- Ağız ve boğaz yarası olan hastaların dikkatle MEBUCAIN kullanması ve doktor veya eczacıya danışmaları gerekir.
- MEBUCAIN, 6 yaşın altındaki çocuklar için tavsiye edilmez.
- Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

MEBUCAIN'in yiyecek ve iecek ile kullanılması

MEBUCAIN'i yemeklerle birlikte veya yemeklerden hemen nce kullanmayınız.

Alkol, setilpiridinyum klorr emilimini arttırdığı ve bu sebeple doz aşıımına sebep olduėu iin kullanımından kaınılmalıdır.

Hamilelik

İlacı kullanmadan nce doktorunuza veya eczacınıza danıřınız.

- MEBUCAIN'i gerekli olmadıka hamilelikte kullanmayınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduėunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danıřınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan nce doktorunuza veya eczacınıza danıřınız.

- MEBUCAIN'i emzirme dneminde kullanmayınız.

Ara ve makine kullanımı

MEBUCAIN'in ara ve makine kullanma yeteneėiniz zerinde etkisi yoktur.

MEBUCAIN'in ieriėinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında nemli bilgiler

MEBUCAIN sorbitol iermektedir. Eėer daha nceden doktorunuz tarafından bazı řekerlere karřı intoleransınız olduėu sylenmiřse bu tıbbi rn almadan nce doktorunuzla temasa geiniz.

Diėer ilalar ile birlikte kullanımı

Eėer reeteli ya da reetesiz herhangi bir ilacı řu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise ltfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. MEBUCAIN nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı iin talimatlar:

Yetiřkinler ve 12 yař ve zerindeki ocuklar:

řiddetli rahatsızlık durumlarında: İhtiyaca gre 1-2 saatte 1 pastil

Hafif rahatsızlık durumlarında: İhtiyaca gre 2-3 saatte 1 pastil

Gnlk 6 pastili ařmamalıdır.

6-12 yařındaki ocuklar

İhtiyaca gre 3-4 saatte bir 1 pastil

Günlük doz 3 pastili aşmamalıdır.

MEBUCAIN'i belirtiler sürerken ardarda en fazla 5 gün kullanınız.

Uygulama yolu ve metodu:

MEBUCAIN'i ağız yoluyla alınız.

MEBUCAIN pastili ağızınızda yavaşça eritiniz. Çiğnemeyiniz ya da yutmayınız.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanım:

MEBUCAIN'in 6 yaşın altındaki çocuklarda kullanımı önerilmemektedir.

Yaşlılarda kullanım:

MEBUCAIN'in yaşlılarda kullanımı araştırılmamıştır.

Özel kullanım durumları:

Özel kullanımı yoktur.

Eğer MEBUCAIN'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla MEBUCAIN kullandıysanız:

MEBUCAIN'in fazla miktarda kazara yutulması bulantı ve kusmaya neden olabilir. Derhal süt veya suda çırpılmış yumurta beyazının verilmesi önerilmektedir.

MEBUCAIN'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

MEBUCAIN'i kullanmayı unutursanız

Eğer MEBUCAIN'in bir dozunu almayı unutursanız, hatırladığınız anda ilacınızı alınız ve ardından gerektiği takdirde dört saat içinde tedaviye devam ediniz.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz uygulamayınız.

MEBUCAIN ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler

MEBUCAIN ardarda en fazla 5 gün kullanım içindir.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, MEBUCAIN'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Yan etkiler ařağıdaki kategorilerde gösterildiğı şekilde sıralanmıřtır.

- Çok yaygın : 10 hastanın en az 1'inde görülebilir.
Yaygın : 10 hastada 1'den az, fakat 100 hastada 1'den fazla görülebilir.
Yaygın olmayan : 100 hastada 1'den az, fakat 1000 hastada 1'den fazla görülebilir.
Seyrek : 1000 hastada 1'den az, fakat 10.000 hastada 1'den fazla görülebilir.
Çok seyrek : 10.000 hastada 1'den az görülebilir.
Bilinmeyen : Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

Seyrek : Bulantı, hafif lokal geçici ağız ve boğaz iritasyonu, kızarıklık

Çok seyrek : Döküntü

Bunlar MEBUCAIN'in hafif yan etkileridir.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemřireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılařtığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan "İlaç Yan Etki Bildirimi" ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)'ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduėunuz ilacın güvenliliğı hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı saėlamıř olacaksınız.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

5. MEBUCAIN'in saklanması

MEBUCAIN'i çocukların göremeyeceğı, erişemeyeceğı yerlerde ve ambalajında saklayınız.

30°C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Etiketinin veya ambalajının üzerinde belirtilen son kullanma tarihinden sonra MEBUCAIN'i kullanmayınız.

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz MEBUCAIN'i kullanmayınız.

Ruhsat Sahibi : GlaxoSmithKline Tüketici Sağlığı A.Ş
Levent, Şişli-İSTANBUL

Üretim Yeri : Novartis Ürünleri
Kurtköy-İstanbul

Bu kullanma talimatı tarihinde onaylanmıştır.