

## KULLANMA TALİMATI

### **METRİN % 5 Deri Kremi** **Haricen kullanılır.**

**Etkin maddeler:** Her 1 g' ında; 50 mg permetrin içerir.

**Yardımcı maddeler:** Setil alkol, Setil stearil alkol, Parafin likit, Propilen glikol, Metil hidroksibenzoat, Propil hidroksibenzoat, Sitrik asit, Butil hidroksi toluen, Deiyonize su

**Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.**

- Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
- Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
- Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
- Bu ilacın kullanımı sırasında doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
- Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında **yüksek veya düşük doz kullanmayınız.**

### **Bu kullanma talimatında:**

1. **METRİN nedir ve ne için kullanılır?**
2. **METRİN kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler**
3. **METRİN nasıl kullanılır?**
4. **Olası yan etkiler nelerdir?**
5. **METRİN' in saklanması**

**Başlıkları yer almaktadır.**

### **1. METRİN nedir ve ne için kullanılır?**

METRİN, bit ve benzerlerine karşı etki gösterir ve bu hayvanları, sinir sistemlerini etkileyerek öldürür.

METRİN, 30 g' lık alüminyum tüpler halindedir.

METRİN, uyuz tedavisi ve pubis biti enfestasyonlarında/bulaşmalarında kullanılır.

### **2. METRİN'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler** **METRİN'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ**

Eğer;

- Piretroidler, piretrinler ve ilacın bileşiminde bulunan herhangi bir maddeye karşı aşırı duyarlılığınız (alerji) varsa

### **METRİN'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ**

- METRİN' in gözlerinizle temas etmemesine dikkat edin. Eğer gözünüze temas ederse gözünüzü bol suyla yıkayınız.

- Eğer METRİN' i yüzünüze sürecekseniz, göz çevresine yakın uygulamalarda dikkat ediniz.
- Eğer çocuğunuza uygulayacaksanız, ağız çevresine sürmemeye dikkat ediniz. Çocuğunuz ilacı yalayabilir.
- Sürekli uyguluyorsanız, ellerinizin tahriş olmaması için eldiven kullanınız.

### **Hamilelik**

*İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*

METRİN' in gebelikte kullanımı ile ilgili bilgi kısıtlıdır. METRİN tedavisini takiben fetüs üzerinde oluşturabileceği zararlı etki çok azdır.

*Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*

### **Emzirme**

METRİN' in insanlarda anne sütü içinde atılıp atılmadığı bilinmemektedir. Ancak teorik olarak çok küçük yüzdesi anne sütüne geçecektir. Bu kadar düşük miktarların yenidoğan/bebek için risk oluşturması beklenmez.

*İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*

### **Araç ve makine kullanımı**

METRİN' in araç ve makine kullanımı üzerine etki etmesi olası değildir.

### **METRİN' in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler**

İçeriğindeki bütil hidroksitoluen nedeniyle, lokal deri reaksiyonlarına (örneğin, kontak dermatite) ya da gözlerde ve mukoz membranlarda tahrişe sebebiyet verebilir.

### **Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı**

METRİN' in bilinen herhangi bir ilaç etkileşimi yoktur.

*Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.*

## **3. METRİN nasıl kullanılır?**

### **Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:**

#### *Uyuz tedavisi*

Cilt tipi ve yüzey alanında bireysel değişikliklerin farklılığı göz önünde bulundurulduğunda doz konusunda kesin tavsiyeler yapılması mümkün değildir.

*Erişkinler ve 12 yaşın üzerindeki çocuklar:* Tek uygulamada yaklaşık 1 tüpe kadar. Bazı erişkinlerde tüm vücudu kaplamak için 30 g' lık 1 tüpten fazlası gerekebilirse de 2 tüpten (60 g) fazlası uygulanmamalıdır.

### *Pubis biti tedavisi*

30 g' lık bir tpn 1/3' , pubik blge, ans vresi, uyluk blgesi ve gvdeye uygulanması tavsiye edilir. Az bir eriŐkin grubu tedaviyi tamamlamak iin daha fazla kreme ihtiya duyabilir, fakat 30 gramlık tpn 2/3' nden fazlası kullanılmamalıdır.

### **Uygulama yolu ve metodu:**

#### *Uyuz tedavisi:*

1. DuŐ alandıktan sonra temiz ve serin vcud a baŐ dıŐında tm vcut kaplanacak Őekilde uygulanır.
2. Uygulamada zellikle el ve ayak parmakları arasında kalan alanlar, bilekler, koltuk altları, dıŐ genital organlar, kaba etler, el ve ayak tırnaklarının altına dikkat edilmelidir.
3. 8-12 saat beklenir. Bekleme sresinde eller yıkanmıŐsa, ellere tekrar srlmesine zen gsterilir.
4. Uygulama sonrasında duŐ alınır.
5. Temiz giysiler giyilir, yatak arŐafı ve giysiler sıcak su ile yıkanıp, sıcak t ile tlenir.

#### *Uyuzdan Korunmanın Yolları*

1. Tm aile kontrol edilmeli, bulaŐması olası aile dıŐı arkadaŐ veya akrabalar uyarılmalıdır.
2. Tm aile bireyelerine uyuz tedavisi uygulanmalıdır.
3. Uyuz bceęi eŐyalar zerinde 2-3 gn yaŐayabildięi iin, tm eŐyalar ve giysiler kaynar su ile 20 dakika sre ile yıkanmalı, tm giysilerin (giyecekler, arŐaf, yastık kılıfları vs.) zellikle vcutla temas eden i blgeleri sıcak t ile tlenmelidir.
4. Tm ev ve araba elektrik sprgesi ile temizlenmelidir.

*2 aylıktan 2 yaŐa kadar ocuklarda ve yaŐlılarda:* 2 yaŐın zerindeki ocuklar ve eriŐkinlerdeki uygulamaya benzerdir. Buna raęmen, bu hasta gruplarında, uyuz lezyonları yz, boyun, salı deride ve kulaklara daha ok sıramıŐ olduęundan, METRİN' in bu blgelere de srlmesi etkilidir. Hastaların yaklaŐık % 90'ında uyuz enfestasyonu kremin tek bir uygulaması ile giderilir. Eęer varolan lezyonlarda iyileŐme belirtisi yoksa veya yeni lezyonlar oluŐursa, ikinci bir uygulama 7 gnden nce olmamak zere yapılabilir.

### *Pubis biti tedavisi*

METRİN, pubik blgeyi, ans vresini, uyluk blgesinin i tarafından dizlere kadar ve pubik blgeye uzanan gvdedeki tyleri kaplayacak Őekilde uygulanmalıdır. Kirpikler ve kaŐlar hari yz tylerinde de, bit ve sirke enfestasyonu bulunursa uygulanmalıdır. Kirpiklerde, bit ve sirke bulunursa, cımbız ile alınmalı, METRİN iritasyona neden olabileceęi iin gzlerde kullanılmamalıdır. Enfestasyon bir uygulama ile tamamen ortadan kaldırılabılır. Buna raęmen, uygulamadan 7 gn sonra uygulanan blgede canlı bit grlrse, ikinci bir tedavi uygulanabilir.

### **Değişik yaş grupları:**

- **Çocuklarda kullanım:**

#### *Uyuz tedavisi*

*12 yaşın altındaki çocuklar:* 30 gramlık bir tüp esas alınarak tek uygulamada kullanılacak yaklaşık krem miktarı aşağıdaki tabloda belirtilmektedir.

2 aylıktan 1 yaşa kadar çocuklar Bir tüpün 1/8' i kadar

1 ile 5 yaş arasındaki çocuklar Bir tüpün 1/4' ü kadar

6 ile 12 yaş arasındaki çocuklar Bir tüpün 1/2' si kadar

Baş boyun saçlı deri ve kulakların da tedavisi gerektiği durumlarda, tüm vücudun kaplanması için doz artırılabilir.

#### *Pubis biti tedavisi*

Çocuklar ve nispeten az tüylü kişilerde oransal olarak daha az krem kullanılmalıdır.

- **Yaşlılarda kullanımı:** 70 yaş üzerindeki hastalar doktor kontrolünde kullanılmalıdır.

### **Özel kullanım durumları:**

- **Böbrek ve karaciğer yetmezliği:** Veri yoktur.

*Eğer METRİN' in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşun.*

### **Kullanmanız gerekenden daha fazla METRİN kullandıysanız:**

METRİN' in aşırı uygulanması bölgesel yan etkiler veya daha ciddi deri reaksiyonları ihtimali taşır.

Aşırı duyarlılık reaksiyonları görüldüğünde belirtilere yönelik tedavi yapılır. Eğer çocuğunuz kazara METRİN içeriğini yutarsa, yutmayı takiben 2 saat içinde hekime başvurulmuş durumlarda midenin yıkanması uygundur.

*METRİN' den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.*

### **METRİN' i kullanmayı unutursanız**

*Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.*

### **METRİN ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler**

Doktorunuzun size söylediği süre zarfında kullanın.

### **4. Olası yan etkiler nelerdir?**

Tüm ilaçlar gibi, METRİN' in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Yan etkiler ařağıdaki kategorilerde gösterildiğı şekilde sınıflandırılmıştır:

Çok yaygın:	10 hastanın en az birinde görülebilir.
Yaygın:	10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.
Yaygın olmayan:	100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir.
Seyrek:	1.000 hastanın birinden az görülebilir.
Çok seyrek:	10.000 hastanın birinden az görülebilir.
Bilinmiyor:	Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

#### **Bilinmiyor**

- Ağrı
- Yanma veya batma hissi şeklinde tanımlanan deri rahatsızlığı, eritem, ödem, egzama, kızarıklık ve kaşıntı
- Hissizlik

*Eğer bu kullanma talimatında söz edilmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşılırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.*

#### **5. METRİN' in saklanması**

METRİN' i çocukların göremeyeceğı, erişemeyeceğı yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25°C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

#### **Son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız.**

*Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra METRİN' i kullanmayınız.*

*Çevreyi korumak amacıyla kullanmadığınız METRİN' i şehir suyuna veya çöpe atmayınız. Bu konuda eczacınıza danışınız.*

**Ruhsat Sahibi:** Bikar İlaç San. ve Tic. Ltd. Şti.

Güllübağlar Mah. Ankara Cad. Şirin Sok. No: 14  
Pendik/İstanbul

**Üretim Yeri:** Bikar İlaç San. ve Tic. Ltd. Şti.

Güllübağlar Mah. Ankara Cad. Şirin Sok. No: 14  
Pendik/İstanbul

*Bu kullanma talimatı .... /.... /.... tarihinde onaylanmıştır.*