

## KULLANMA TALİMATI

### OXAP 40 mg film tablet

Ağızdan alınır.

- **Etkin madde:** 40 mg olmesartan medoksomil içerir.
- **Yardımcı maddeler:** Mikrokristalize selüloz (Avicel PH101), hidroksipropilselüloz, düşük-hidroksipropil selüloz, susuz koloidal silika (Aerosil 200) laktoz monohidrat (inek sütü kaynaklı) püskürtülerek kurutulmuş 316FF, mikrokristalize selüloz (Avicel PH102), magnezyum stearat, Opadry 03A23889 Beyaz (hidroksipropilmetilselüloz 2910/hipromelloz 6 cP, titanyum dioksit, talk) içerir.

**Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.**

- *Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.*
- *Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*
- *Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.*
- *Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.*
- *Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında **yüksek veya düşük** doz kullanmayınız.*

### **Bu Kullanma Talimatında:**

1. ***OXAP nedir ve ne için kullanılır?***
2. ***OXAP'ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler***
3. ***OXAP nasıl kullanılır?***
4. ***Olası yan etkiler nelerdir?***
5. ***OXAP 'ın saklanması***

**Başlıkları yer almaktadır.**

#### **1. OXAP nedir ve ne için kullanılır?**

OXAP tabletler, beyaz renkli, oval, film kaplı tabletlerdir.

OXAP kan damarlarını gevşeterek kan basıncının düşürülmesine yardımcı olan, olmesartan medoksomil adlı madde içeren bir ilaçtır ve 28 ve 84 film tablet halinde kullanıma sunulmuştur. Olmesartan medoksomil anjiyotensin-II reseptör antagonistleri isimli bir ilaç grubuna aittir. OXAP sebebi bilinmeyen yüksek kan basıncı (esansiyel hipertansiyon) tedavisi için doktorunuz tarafından gerekli görüldüğü takdirde kullanılır.

Yüksek kan basıncı, kalp, böbrek, beyin ve göz gibi organlarda kan damarlarına zarar verebilir. Bu durum, bazen kalp krizi, kalp ya da böbrek yetmezliği, inme veya körlük gibi sonuçlar

doğurabilir. Genellikle yüksek kan basıncının belirtileri yoktur. Ortaya çıkabilecek zararları engellemek için kan basıncını kontrol etmek önemlidir.

Yüksek kan basıncı, OXAP gibi ilaçlarla kontrol altında tutulabilir. Doktorunuz, kan basıncını düşürmek için hayat tarzınıza dair bazı değişiklikler yapmanızı (kilo vermek, sigarayı bırakmak, alınan alkol miktarını ve yemeklerde kullanılan tuz oranını azaltmak) ve aynı zamanda yürüyüş ve yüzme gibi rutin egzersizler yapmanızı önerecektir. Doktorunuzun bu tavsiyelerine uymanız önemlidir.

## **2. OXAP'ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler**

### **OXAP'ı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ:**

Eğer,

- OXAP'ın etkin maddesine veya yardımcı maddelerine karşı aşırı duyarlılığınız (alerjiniz) var ise,
- Hamileyseniz
- Cilt ve gözlerde sararma (sarılık) ya da safra kesesinden safra çıkışı olması ile ilgili sorunlarınız (biliyer tıkanıklık, örn; safra taşları) varsa
- Diyabetseniz veya böbrek fonksiyonu bozukluğunuz varsa ve aliskiren içeren kan basıncını düşüren bir ilaçla tedavi ediliyorsanız

### **Uyarılar ve önlemler**

OXAP almadan önce doktorunuza danışınız.

Yüksek kan basıncını tedavi etmekte kullanılan aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini alıyorsanız, doktorunuza söyleyin:

- Özellikle diyabetle ilişkili böbrek sorunlarınız varsa ADE inhibitörü (örneğin, enalapril, lisinopril, ramipril),
- Aliskiren

Doktorunuz böbrek fonksiyonunuzu ve kanınızdaki elektrolit (örn. potasyum) miktarını düzenli aralıklarla kontrol edebilir.

### **OXAP'ı aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ:**

Eğer,

- Böbrek fonksiyon bozukluğunuz varsa,
- Karaciğer hastalığınız varsa,
- Kalp yetmezliğiniz ya da kalp kapakçığı veya kalp kası ile ilgili rahatsızlığınız varsa,
- Şiddetli kusuyorsanız veya ishalseniz, yüksek dozda idrar söktürücü (diüretik) tedavisi görüyorsanız ya da düşük tuz içeren diyet uyguluyorsanız,
- Kan tahlillerinizde yüksek potasyum tespit ediliyorsa,
- Böbreküstü bezlerinizle ilgili probleminiz varsa.

Ciddi, kalıcı olan ve önemli kilo kaybına neden olan bir ishal yaşarsanız doktorunuzla temasa geçin. Doktorunuz semptomlarınızı değerlendirebilir ve kan basıncı ilaçlarınıza nasıl devam edeceğinize karar verebilir.

Kan basıncını azaltan her ilaçla olduğu gibi, kalp veya beyine ait kan akımı bozuklukları olan hastalarda, kan basıncındaki aşırı bir düşüş kalp krizi veya inmeye neden olabilir. Bu sebeple doktorunuz kan basıncınızı dikkatle ölçecektir.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

### **OXAP'ın yiyecek ve içecek ile kullanılması:**

OXAP yiyeceklerle birlikte veya öğünler arasında alınabilir.

### **Hamilelik**

*İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*

Hamile iseniz OXAP kullanmayınız.

Eğer hamileyseniz (veya olabileme ihtimaliniz varsa) doktorunuza söyleyiniz. Doktorunuz hamile kalmadan önce veya hamile olduğunuzu anladığınız anda OXAP'ı kullanmayı bırakmanızı ve OXAP yerine başka bir ilaç kullanmanızı önerecektir.

*Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*

### **Emzirme**

*İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*

Emziriyorsanız veya emzirmeye başlayacaksanız doktorunuza söyleyiniz. OXAP emziren annelere önerilmemektedir. Emzirecekseniz, özellikle bebeğiniz yenidoğan ya da prematüre ise doktorunuz başka bir tedavi seçebilir.

Eğer hamileyseniz ya da emziriyorsanız veya hamile olabileceğinizi düşünüyorsanız ya da bebek sahibi olmayı planlıyorsanız, bu ilacı kullanmadan önce doktorunuzun veya eczacınızın tavsiyelerini alınız.

### **Araç ve makine kullanımı**

Yüksek kan basıncınızın tedavisi sırasında kendinizi uyukulu veya sersemlemiş hissedebilirsiniz. Eğer böyle bir durum olursa, etkiler geçene kadar araç ve makine kullanmayınız ve kullanımları ile ilgili doktorunuzun tavsiyelerini alınız.

### **Siyah ırktan hastalarda kullanımı**

Diğer benzer ilaçlar ile olduğu gibi OXAP'ın kan basıncı düşürücü etkisi, siyah ırktan hastalarda daha düşük olabilir.

### **OXAP'ın içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler**

OXAP, laktoz (bir şeker tipi) içerir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

### **Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı**

Aşağıdaki ilaçları kullanıyorsanız ya da son zamanlarda kullandınız ise doktorunuza veya eczacınıza söyleyiniz:

- Diğer kan basıncı düşürücü ilaçlar OXAP'ın etkisini artırabilir. Doktorunuz dozunuzu değiştirebilir ve/veya başka önlemler alabilir.
- ADE inhibitörü veya aliskiren alıyorsanız (ayrıca “OXAP’ı kullanmayınız” ve “Uyarılar ve önlemler” başlıkları altında verilen bilgilere bakınız).
- Potasyum destek tedavisi, potasyum içeren bir tuz bileşeni, idrar söktürücü (diüretik) veya heparin (kan sulandırıcı) ile tedavi görüyorsanız, bu ilaçları OXAP ile birlikte kullanmak kandaki potasyum seviyesini artırabilir.
- Lityum (duygu değişiklikleri ve bazı depresyon tiplerinin tedavisi için bir ilaç) kullanıyorsanız, OXAP ile birlikte kullanmak lityumun toksisitesini artırabilir. Lityum almak zorundaysanız, doktorunuz kan lityum seviyelerinizi kontrol edecektir.
- Non Steroidal Anti İnflamatuvar İlaçların (ağrı, şişlik gibi iltihap bulgularını geçirmek için kullanılan ilaçlar, steroid yapılı olmayan antiinflamatuvar ilaçlar) OXAP ile birlikte kullanımı, böbrek yetmezliği riskini artırabilir ve OXAP'ın etkisini azalabilir.
- Kandaki kolesterol seviyesini düşüren bir ilaç olan Kolesevelam Hidroklorid, OXAP'ın etkisini azaltabilir. Doktorunuz size OXAP'ı kolesevelam hidroklorürden en az 4 saat önce almanızı tavsiye edebilir.
- Hazımsızlık ilaçları (antiasit), OXAP'ın etkisini biraz azaltabilir.

*Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.*

### **3. OXAP nasıl kullanılır?**

#### **Uygun kullanım ve doz uygulama sıklığı için talimatlar:**

- OXAP'ı daima doktorunuzun tavsiye ettiği şekilde kullanınız. Herhangi bir durumdan emin değilseniz, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
- Tavsiye edilen başlangıç dozu günde bir tane OXAP 10 mg'dır. Eğer bununla kan basıncınız kontrol altına alınmazsa, doktorunuz günlük dozu OXAP 20 mg veya OXAP 40 mg'a yükseltebilir ya da başka ilaçlar reçeteleyebilir.

#### **Uygulama yolu ve metodu:**

- OXAP yiyeceklerle birlikte veya öğünler arasında, yeterli miktar (1 bardak) su ile yutularak alınır. Tablet çiğnenmemelidir.
- Mümkünse günlük ilaç dozunuzu daima günün aynı saatinde, örneğin kahvaltıda alınız.
- Doktorunuz size aksini söyleyene kadar OXAP'ı almaya devam etmeniz çok önemlidir.

#### **Değişik yaş grupları**

##### **Çocuklarda kullanımı:**

Çocukların ve 18 yaşın altındaki ergenlerin OXAP kullanması tavsiye edilmez.

##### **Yaşlılarda kullanımı:**

65 yařın üzerindeyseniz ve doktorunuz gnlk dozunuzu 40 mg'a artırmaya karar verirse, kan basıncınızın çok dřmediđinden emin olmak iin kan basıncınız doktorunuz tarafından dzenli olarak kontrol edilmelidir.

### **zel kullanım durumları**

#### **Bbrek yetmezliđi**

Hafif-orta bbrek yetmezliđi olan hastalarda gnlk doz 20 mg'dan fazla olmamalıdır. Őiddetli bbrek yetmezliđi olan hastalarda OXAP kullanımı nerilmez.

#### **Karaciđer yetmezliđi**

Hafif karaciđer yetmezliđi olan hastalarda doz ayarlamasına gerek yoktur. Orta derecede karaciđer yetmezliđi olan hastalarda gnlk doz 20 mg'dan fazla olmamalıdır. Őiddetli karaciđer yetmezliđi olan hastalarda OXAP kullanımı nerilmez.

*Eđer OXAP'ın etkisinin ok gl veya zayıf olduđuna dair bir izlemeniz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuřunuz.*

#### **Kullanmanız gerekenden daha fazla OXAP kullandıysanız:**

OXAP'tan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmıřsanız veya bir ocuk yanlışlıkla kullandıysa, ila paketinizi yanınıza alarak derhal doktorunuz veya en yakın hastane ile temasa geiniz.

#### **OXAP'ı kullanmayı unutursanız:**

Gnlk almanız gereken dozunuzu almayı unuttuysanız, ertesini gn normal ila dozunuzu alınız. *Unutulan dozları dengelemek iin ift doz almayınız.*

#### **OXAP ile tedavi sonlandırıldıđında oluřabilecek etkiler:**

Doktorunuz tedaviyi kesmenizi sylemedike OXAP'ı almaya devam etmeniz nemlidir.

#### **4. Olası yan etkiler nelerdir?**

Tm ilalar gibi, her hastada olmasa da OXAP'ın yan etkileri grlebilir. Bu yan etkiler oluřursa genellikle hafif Őiddetlidir ve tedavinin kesilmesini gerektirmez.

Her hastada grlmese de, ařađıdaki iki yan etki ciddi olabilir:

Seyrek olarak (1000 kiřiden en fazla birinde) grlen ve tm vcudu etkileyebilen alerjik reaksiyonlar ařađıdaki gibidir:

OXAP tedavisi sırasında kařıntı ve dknt ile birlikte yzde, ađızda ve/veya gırtlakta Őiřme oluřabilir. Bu durumda **OXAP'ı kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz.**

Seyrek olarak (yařlı hastalarda biraz daha fazla olmak zere) hassas kiřilerde veya alerjik reaksiyonun bir sonucu olarak OXAP kan basıncının fazla dřmesine sebep olabilir. Bu da Őiddetli sersemlik ve bayılmaya neden olabilir. **Bu durum oluřursa OXAP'ı kullanmayı durdurunuz, DERHAL doktorunuza bildiriniz ve dz uzanınız.**

Bunlar OXAP'ın diđer bilinen yan etkileridir:

**Yaygın (10 kiřiden en fazla birinde):**

Sersemlik hissi, bař ađrısı, bulantı, hazımsızlık, ishal, karın ađrısı, ishal ve kusma ile birlikte grlen mide ve barsak enfeksiyonu, yorgunluk, bođaz ađrısı, burun akması veya dolması, bronř iltihabı, grip benzeri belirtiler, ksrk, ađrı ggste, sırtta, kemiklerde veya eklemlerde ađrı, idrar yollarında enfeksiyon, ayak bileklerinde, ayaklarda, bacaklarda, ellerde veya kollarda řiřme, idrarda kan.

Kan testi sonularında da bazı deđiřiklikler grlmřtr:

Kanda trigliserid miktarının ykselmesi (hipertrigliseridemi), kanda kanda rik asit miktarının ykselmesi (hiperrisemi), kanda re artıřı, karaciđer ve kas fonksiyon testlerinde artıř.

**Yaygın olmayan (100 kiřiden en fazla birinde):**

Tm vcudu etkileyebilen hızlı alerjik reaksiyonlar, nefes alma sorunlarının yanısıra kan basıncında hızlı bir dřř olması ve buna bađlı olarak bayılma (anafilaktik reaksiyonlar), yzde řiřme, denge bozukluđundan kaynaklanan bař dnmesi (vertigo), kusma, gszlk, kt hissetme, kas ađrısı, deride dknt, alerjik deri dknts, kařıntı, ekzantem (deride kabarıklık ve erupsiyon), ciltte kabarıklıklar (sivilceler), ggste ađrı ve huzursuzluk hissi (anjina).

Kan testlerinde trombosit (kan pulcuđu) olarak bilinen bir eřit kan hcresinin sayısında azalma (trombositopeni).

**Seyrek (1000 kiřiden en fazla birinde):**

Enerji azlıđı, kas krampları, bbrek fonksiyonunda bozulma, bbrek yetmezliđi, kan testi sonularında potasyum dzeyinin normalin stne ykselmesi (hiperkalemi) ve bbrek fonksiyonuyla ilgili bileřenlerin seviyelerinde artıř gsteren bazı deđiřiklikler grlebilir.

**ocuklarda ve genlerde ilave yan etkiler:**

ocuklarda yan etkiler, yetiřkinler iin bildirilenler ile benzerdir. Ancak bař dnmesi ve bař ađrısı ocuklarda daha sık grlr ve burun kanaması yalnızca ocuklarda grlen yaygın bir yan etkidir.

*Eđer bu kullanma talimatında bahsi gemeyen herhangi bir yan etki ile karřılařırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.*

**Yan etkilerin raporlanması**

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemřireniz ile konuřunuz. Ayrıca karřılařtıđınız yan etkileri [www.titck.gov.tr](http://www.titck.gov.tr) <<http://www.titck.gov.tr>> sitesinde yer alan ‘‘İla Yan Etki Bildirimi’’ ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Trkiye Farmakovijilans Merkezi (TFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduđunuz ilacın gvenliliđi hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sađlamıř olacaksınız.

**5. OXAP'ın saklanması**

*OXAP'ı ocukların gremeyeceđi, eriřemeyeceđi yerlerde ve ambalajında saklayınız.*

25°C altında oda sıcaklığında saklayınız.

**Son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız.**

*Ambalajın üzerinde belirtilen son kullanma tarihinden sonra OXAP'ı kullanmayınız.*

*Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz OXAP'ı kullanmayınız.*

*Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.*

***Ruhsat sahibi:***

Zentiva Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Şişli-İstanbul

***Üretim Yeri:***

Zentiva Sağlık Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.

Büyükkarıştıran 39780 Lüleburgaz / Kırklareli

*Bu kullanma talimatı ..... tarihinde onaylanmıştır.*