

## KULLANMA TALİMATI

### **RELPAK 40 mg film kaplı tablet**

Ağızdan alınır.

**Etkin madde:** 40 mg eletriptan

**Yardımcı maddeler:** Mikrokristalize selüloz, laktoz monohidrat, kroscarmelloz sodyum, magnezyum stearat, titanyum dioksit (E171), hipromelloz, gliserol triasetat, sunset sarısı alüminyum lak (E110).

**Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.**

- *Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.*
- *Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*
- *Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.*
- *Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.*
- *Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında **yüksek veya düşük** doz kullanmayınız.*

### **Bu Kullanma Talimatında:**

1. **RELPAK nedir ve ne için kullanılır?**
2. **RELPAK'ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler**
3. **RELPAK nasıl kullanılır?**
4. **Olası yan etkiler nelerdir?**
5. **RELPAK'ın saklanması**

**Başlıkları yer almaktadır.**

#### **1. RELPAK nedir ve ne için kullanılır?**

RELPAK, yuvarlak, konveks, bir yüzünde 'Pfizer', bir yüzünde "REP40" yazan portakal renkli 1, 3 ve 6 film kaplı tablet içeren, blister ambalajlarda bulunur.

RELPAK, serotonin reseptör agonistleri olarak bilinen bir ilaç grubundandır. Serotonin beyinde doğal olarak bulunan ve damarların daralmasına yardımcı olan bir maddedir.

RELPAK, auralı (migren baş ağrısı başlamadan önce görülebilen görme bozuklukları, uyuşma ve konuşma bozuklukları ile seyreden dönem) veya aurasız migrenin baş ağrısı fazının akut tedavisinde kullanılır.

## 2. RELPAX'ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

### RELPAX'ı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

- Eletriptana veya RELPAX'ın içerdiği diğer maddelere karşı alerjiniz varsa,
- Ciddi karaciğer veya böbrek hastalığınız varsa,
- Tedavi edilmeyen veya kontrol altına alınamayan yüksek tansiyonunuz varsa,
- Kalp krizi veya göğüs ağrısı gibi kalp sorunlarınız olduysa,
- Periferik damar hastalığınız (dolaşım bozukluğunuz) varsa,
- Hafif bile olsa, inme geçirdiyseniz,
- Migren için başka bir ilaç kullanıyorsanız,
- Doktorunuz tarafından migreninizin, hemiplejik, oftalmoplejik veya baziler tipte olduğu belirtilmişse

### RELPAX'ı aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

- RELPAX'ın Sarı Kantaron (St. John's wort - Hypericum perforatum) içeren bitkisel preparatlarla birlikte kullanımı sırasında istenmeyen etkiler daha sık görülebilir.
- Diyabetiniz varsa,
- Sigara kullanıyorsanız veya sigarayı bırakmak için nikotin replasman tedavisi görüyorsanız
- 40 yaşın üzerinde ve erkekseniz
- Menopoz sonrası dönemde bir kadınsanız
- Koroner arter hastalığınız varsa
- Kalp hastalığı için yüksek riskiniz olduğu söylenmişse kullanmadan önce doktorunuza danışmalısınız.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

### RELPAX'ın yiyecek ve içecek ile kullanılması

RELPAX aç karnına veya tok karnına kullanılabilir.

### Hamilelik

*İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz veya hamile kalmayı planlıyorsanız, RELPAX kullanmadan önce doktorunuza danışınız.

*Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*

### Emzirme

*İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*

Eğer emziriyorsanız doktorunuza danışınız. RELPAX kullandıktan sonra 24 saat emzirmekten kaçınınız.

### **Araç ve makine kullanımı**

RELPAK kendinizi uykulu hissetmenize neden olabilir. RELPAK aynı zamanda sersemliğe sebep olabilir. Bu nedenle migren atağı sırasında veya RELPAK aldıktan sonra araç ve makine kullanmaktan kaçınmalısınız.

### **RELPAK'ın içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler**

RELPAK laktoz içerir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı tolerans bozukluğunuz olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuza danışınız.

RELPAK alerjik reaksiyona sebep olabilen azo renklendirici (E110) içerir.

### **Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı**

Bazı ilaçlar RELPAK'ın etkisini değiştirebilir. RELPAK birlikte kullanıldığı diğer ilaçların etkisini azaltabilir.

Bunlar:

- Ketokonazol ve itrakonazol gibi mantar enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılan ilaçlar
- Eritromisin ve klaritromisin gibi antibiyotikler
- Ritonavir, indinavir ve nelfinavir gibi proteaz inhibitörleridir.

Ergotamin (migren tedavisinde kullanılan bir ilaç) veya dihidroergotamin gibi ergotaminden türetilen ilaçları almadan 24 saat öncesi veya aldıktan 24 saat sonrasında RELPAK kullanmamalısınız.

Sarı kantaron (St. John's wort – Hypericum perforatum) içeren bitkisel ürünler ile birlikte RELPAK kullanılmamalıdır. Zaten sarı kantaron kullanıyorsanız, bırakmadan önce doktorunuza danışınız.

RELPAK ile tedaviye başlamadan önce, eğer depresyon veya diğer psikiyatrik hastalıklar için SSRİ (seçici serotonin geri alım inhibitörleri) ve SNRİ (serotonin noradrenalin geri alım inhibitörleri) adı verilen ilaçlardan birini kullanıyorsanız doktorunuza bildirin. Bu ilaçlar belirli migren ilaçları ile birlikte kullanıldıklarında serotonin sendromu adı verilen tehlikeli bir durumun gelişme riskini artırır.

*Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.*

### **3. RELPAK nasıl kullanılır?**

- **Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:** RELPAK'ı migren tipi baş ağrısının başlamasından sonra herhangi bir zamanda kullanabilirsiniz, ancak olabildiğince erken dönemde almanız en iyisidir. Aura döneminde ya da migren atağını önlemek için RELPAK kullanmayınız.

- Olağan başlangıç dozu bir adet 40 mg tablettir.
  - Aldığımız ilk tablet migreninizi geçirmiyorsa, aynı atak için ikinci bir tablet almayınız.
  - Eğer aldığımız ilk tablettten sonra migren ağrınız geçer ve daha sonra tekrar başlarsa, ikinci bir tablet alabilirsiniz. Ancak ikinci tableti almadan önce birinci tableti almanızın üzerinden en az 2 saat geçmiş olmalıdır.
  - 24 saat içinde 80 mg'dan daha yüksek doz almayınız.
  - Bir 40 mg RELPAX tablet dozu migreninizi geçirmiyorsa, doktorunuza bildirin, doktorunuz gelecek ataklar için dozu iki adet 40 mg tablete artırabilir.
- **Uygulama yolu ve metodu:** RELPAX'ı bir bardak suyla, çiğnmeden yutunuz.
  - **Değişik yaş grupları:**

**Çocuklarda kullanımı:** RELPAX 18 yaşın altındaki büyüme ve gelişme çağındakiler (adolesanlar) ve çocuklar için tavsiye edilmemektedir.

**Yaşlılarda kullanımı:** RELPAX 65 yaşın üzerindeki hastalar için tavsiye edilmemektedir

Tabletlerinizi kesinlikle doktorunuzun talimatlarına uygun olarak kullanınız. Emin olmadığımız takdirde doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

- **Özel kullanım durumları:**

**Böbrek yetmezliği:** RELPAX hafif ve orta şiddette böbrek problemleri olan hastalarda kullanılabilir. Ancak maksimum günlük doz 40 mg'ı geçmemelidir. **Bu ilaç ciddi böbrek hastalığı olan hastalarda kullanılmamalıdır.**

**Karaciğer yetmezliği:** Hafif veya orta şiddette karaciğer problemleri olan hastalarda doz ayarlanması gerekmez. Ciddi karaciğer bozukluğu olan hastalarda kullanımına ilişkin yeterli veri olmadığı için bu hastalarda kullanılmamalıdır.

*Eğer RELPAX'ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.*

### **Kullanmanız gerekenden daha fazla RELPAX kullandıysanız:**

Kazara kullanmanız gerekenden daha fazla RELPAX kullanmışsanız hemen doktorunuz ile irtibata geçiniz veya en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz. İçerisinde RELPAX tablet kalmış olup olmadığına bakmaksızın her zaman kullandığınız ilacın ambalajını yanınızda götürünüz.

*RELPAX'tan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.*

#### 4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, RELPAX'ın içeriğinde bulunan maddelere aşırı duyarlı kişilerde yan etkiler olabilir.

**Aşağıdakilerden biri olursa RELPAX'ı kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:**

- Nefes alıp verirken aniden gelişen ıslık sesi, nefes alma güçlüğü; dudaklarda, yüzde veya göz kapaklarında şişme, kaşıntı veya deri döküntüsü (özellikle tüm vücutta). Bunlar aşırı duyarlılık reaksiyonu belirtileri olabilir.
- Eğer cildinizde kabarmaya ve su toplamaya (ağzınızı ve dilinizi etkileyebilir) yol açan deri döküntüsü meydana gelirse bu Steven Johnson Sendrom'u olarak bilinen durumun bir belirtisi veya toksik epidermal nekroliz olabilir. Doktorunuz böyle bir durumda tedavinizi durduracaktır. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise sizin RELPAX'a karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.
- Şiddetli olan ve boğazı da etkileyebilecek sıkışma ve göğüs ağrısı. Bunlar kalp ve dolaşım sistemine ilişkin problemler olabilir (iskemik kalp hastalığı).

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür

#### **Olası diğer yan etkiler:**

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sınıflandırılmıştır:

Çok yaygın	: 10 hastanın en az birinde görülebilir.
Yaygın	: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.
Yaygın olmayan	: 100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir.
Seyrek	: 1.000 hastanın birinden az görülebilir.
Çok seyrek	: 10.000 hastanın birinden az görülebilir.
Sıklığı bilinmeyen	: Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

#### **Yaygın**

- Boğaz ağrısı, burun akıntısı
- Göğüs ağrısı veya sıkışma
- Yorgun veya uykulu hissetmek
- Baş ağrısı
- Sersemlik
- Karıncalanma veya anormal his
- Kas sertliği, güçsüzlüğü
- Dokunma hissinde azalma
- Vertigo (savrulma veya dönme hissi)
- Çarpıntı veya artmış kalp atım hızı
- Sıcaklık hissi veya yüz kızarması
- Boğaz darlığı
- Mide ağrısı
- Hasta hissetme

- Ağız kuruluđu
- Mide rahatsızlığı
- Terleme
- Sırt ağrısı, kas ağrısı

### **Yaygın olmayan**

- Anoreksi (iřtah azalması ve kilo kaybı)
- Heyecan ve kafa karışıklığı hissi, kendini iyi hissetmemek veya kendi gibi hissetmemek, yorgunluk, depresyon, duygudurum deđişiklikleri, uykusuzluk
- Tremor (titreme)
- Hareketlerde yavaşlama/ koordinasyon kaybı
- Konuşmada bozukluk
- Halsizlik
- Tat almada deđişiklik
- Görme bozukluğu, göz ağrısı, kuru veya sulu göz
- Işığa hassasiyet
- Kulak çınlaması, kulak ağrısı
- Periferik vasküler bozukluk (Dolaşım bozukluğu)
- Nefes almada güçlük, esneme
- İshal
- Dilde şişme
- Deri döküntüsü
- Eklem ve kemik ağrısı
- Sık ve çok idrara çıkma
- Yüzde, ellerde ve ayaklarda şişme

### **Seyrek**

- Lenf bezlerinde şişme
- Duygusal kırılganlık (duygu durum deđişikliği)
- Konjonktivit (göz enfeksiyonu)
- Kalp atım hızında yavaşlama
- Şok
- Astım
- Konuşma güçlüđu
- Kabızlık
- Boğazda şişme
- Dilde şişme
- Geđirme
- Sarılık
- Artrit
- Kas güçsüzlüđu
- Seyirme
- Meme ağrısı
- Şiddetli ve uzun adet kanaması

Bildirilen ve bir kısmı ciddi olabilen dięer yan etkiler, bayılma, yüksek tansiyon ve kalın barsaęın iltihabi durumudur. Ayrıca doktorunuz kan anormalliklerini test etmek için düzenli olarak kan örneęi alabilir.

*Eęer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.*

## **5. RELPAX'ın Saklanması**

*RELPAX'ı çocukların göremeyeceęi, erişemeyeceęi yerlerde ve ambalajında saklayınız.*

30°C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

### **Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız**

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra RELPAX kullanmayınız.

***Ruhsat sahibi ve üretici:*** Pfizer İlaçları Ltd.Şti 34347 Ortaköy - İstanbul

*Bu kullanma talimatı 21/11/2011 tarihinde onaylanmıştır.*