

## KULLANMA TALİMATI

### SALSİL®-2 Jel

Cilt üzerine uygulanır.

- **Etkin madde:** Her 1 g jel, 10 mg salisilik asit, 40 mg mikrosünger içinde salisilik asit (%27,5) içerir.
- **Yardımcı maddeler:** Deionize su, allantoin, aloe vera jel, disodyum EDTA, PEG 32, propilen glikol, laureth-4, tween 80, dimetikon, D-pantenol, trietanolamin, germaben II, sepigel 305

**Bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.**

*Bu ilaç sizin reçetesiz olarak temin edip bir doktor yardımı almadan eczacınızın tavsiyesi ile hafif bir hastalığı tedavi etmeniz içindir. Buna karşın, yine de SALSİL®'den en iyi sonuçları alabilmeniz için dikkatli kullanmanız gerekmektedir.*

- *Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.*
- *Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*
- *Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.*
- *Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.*
- *Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında **yüksek veya düşük** doz kullanmayınız.*

### **Bu Kullanma Talimatında:**

1. **SALSİL® nedir ve ne için kullanılır?**
2. **SALSİL®'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler**
3. **SALSİL® nasıl kullanılır?**
4. **Olası yan etkiler nelerdir?**
5. **SALSİL®'in saklanması**

**Başlıkları yer almaktadır.**

### **1. SALSİL® nedir ve ne için kullanılır?**

- Etkin madde olarak salisilik asit içeren SALSİL®, anti-akne preparatları olarak isimlendirilen ilaç grubuna dahildir.
- 60g'lık plastik tüp içerisinde kullanıma sunulmaktadır.
- Jel formunda bir ürün olan SALSİL®, tıkalı gözenekleri açtığı ve siyah nokta/ beyaz nokta (komedon) oluşumunu engellediği için sivilce (akne) tedavisinde, tedaviye yardımcı olmak amacıyla kullanılır. Ayrıca saçlı deri, kaş, göz kapakları, kulak, göğüs ortası ve kasıklarda görülebilen pullu, kaşıntılı döküntü (seboreik dermatit) tedavisinde de temizleyici ve tedaviye yardımcı olarak kullanılabilir.

## **2. SALSİL®'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler**

### **SALSİL®'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ**

Eğer;

- Salisilik aside karşı alerjiniz var ise,
- Şeker (diyabet) veya dolaşım bozukluğu ile ilgili bir hastalığınız var ise,
- SALSİL®'i uygulayacağınız bölgede iltihap veya tahriş var ise,
- SALSİL®'i kullandıktan sonra ışın tedavisine girecek iseniz, kullanmayınız.

SALSİL® 2 yaşın altındaki çocuklarda kullanılmamalıdır.

### **SALSİL®'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ**

- SALSİL®, gözlere ve ağız, burun gibi bazı organların iç yüzeylerini kaplayan ve salgı üreten dokulara (mukozalara) temas etmemelidir; temas ettiği takdirde derhal bol su ile 15 dakika boyunca yıkayınız.
- SALSİL® kullanımına bağlı olarak ciltte kuruluk ve tahriş meydana gelebilir. Uygulanan bölgede kuruluk ve pullanma görülmesi durumunda günde bir kez ya da gün aşırı kullanınız.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

### **SALSİL®'in yiyecek ve içecek ile kullanılması**

SALSİL®'in uygulama yolu itibariyle yiyecek ve içeceklerle etkileşimi yoktur.

### **Hamilelik**

*İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*

SALSİL®'in gebe kadınlarda kullanımına ilişkin yeterli veri mevcut değildir.

Hamile olmanız durumunda SALSİL®'i kullanıp kullanamayacağınıza ancak doktorunuz karar verebilir.

*Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*

### **Emzirme**

*İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*

Emzirme döneminde SALSİL® kullanımı konusunda doktorunuza danışınız.

## **Araç ve makine kullanımı**

SALSİL®'in araç ve makine kullanma yeteneğiniz üzerindeki etkisi bilinmemektedir.

## **SALSİL®'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler**

Bileşiminde bulunan propilen glikol ve Germaben II nedeniyle, ciltte tahrişe (iritasyona) ve alerjik reaksiyonlara (muhtemelen gecikmiş) sebebiyet verebilir.

## **Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı**

SALSİL® ile aynı anda ya da SALSİL®'i uyguladıktan hemen sonra başka bir deriye sürmek suretiyle uygulanan (topikal) akne ilacı kullanmayınız.

Doktorunuz veya eczacınıza danışmadan SALSİL®'i aşağıdaki maddelerle birlikte kullanmayınız.

- Soyucu etkiye sahip cilt temizleyiciler veya medikal sabunlar
- Tıraş sonrasında kullanılan losyonlar
- Tıraş kremi veya losyonları gibi alkol içeren ürünler
- Parfümlü sabunlar
- Kurutucu etkiye sahip olan kozmetikler veya sabunlar
- Tedavi edici etkiye sahip kozmetikler (medikal kozmetikler)
- Akne tedavisinde kullanılan diğer ilaçlar
- İzotretinoin, tretinoin, benzoil peroksit, rezorsinol ve sülfür gibi soyucu etkiye sahip maddeleri içeren ilaçlar
- Doku büzücü ilaçlar (astrenjanlar)

*Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.*

## **3. SALSİL® nasıl kullanılır?**

- **Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:**

Doktor veya eczacınız tarafından başka bir şekilde tavsiye edilmediği takdirde, günde bir ya da iki kez cilt sabunlu su ile yıkanıp durulandıktan sonra, akneli bölgelere yaygın olarak ince bir tabaka halinde uygulayınız ve cildinizde bırakınız.

Benzoil peroksit içeren başka bir topikal akne ilacı kullanıyorsanız bu ilacı gündüz, SALSİL®'i ise gece yatarken uygulayınız.

- **Uygulama yolu ve metodu:**

SALSİL® yalnızca cilt üzerine uygulanır. SALSİL®'i parmak ucunuzla cilt üzerine uygulayınız.

## **Değişik yaş grupları:**

### **Çocuklarda kullanımı:**

2 yaşın altındaki çocuklarda kullanılmamalıdır.

### **Yaşlılarda kullanımı:**

Yaşlılarda akne görülmediğinden özel kullanım önerisi yoktur.

### **● Özel kullanım durumları:**

#### **Böbrek / Karaciğer yetmezliği:**

Böbrek ve karaciğer yetmezliği olan hastalarda etkinlik ve güvenilirliği incelenmemiştir.

*Eğer SALSİL®'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.*

#### **Kullanmanız gerekenden daha fazla SALSİL® kullandıysanız:**

*SALSİL®'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.*

SALSİL®'i vücudun geniş bir bölgesine gereğinden fazla miktarda ve uzun süreyle uygulamanız durumunda, salisilik asit kan dolaşımına (sistemik dolaşım) geçebilir ve zehirlenmeye neden olabilir.

Zehirlenme belirtileri: baş dönmesi, işitme bozukluğu, halsizlik, bulantı, kusma, ishal ve bazı psikolojik değişikliklerdir.

Zehirlenme belirtilerinin görülmesi veya kazara yutulması halinde, derhal size en yakın hastanenin acil servis bölümüyle veya doktorunuzla temasa geçiniz.

#### **SALSİL®'i kullanmayı unutursanız**

*Unutulan dozları dengelemek için çift doz kullanmayınız.*

#### **SALSİL® ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler**

SALSİL® tedavisi sonlandırıldığında herhangi bir olumsuz etki oluşması beklenmez.

#### 4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi SALSİL®'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sınıflandırılmıştır:

Çok yaygın: 10 hastanın en az birinde görülebilir.

Yaygın: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir.

Seyrek: 1.000 hastanın birinden az görülebilir.

Çok seyrek: 10.000 hastanın birinden az görülebilir.

Bilinmiyor: Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

Çok yaygın görülen yan etkiler:

- Hafif şiddette deri tahrişi

Seyrek görülen yan etkiler:

- Şiddetli veya orta şiddette deri tahrişi

Sıklık derecesi bilinmeyen yan etkiler:

- Ciltte kuruluk, soyulma, kabarma, kızarma ve anormal sıcaklık

Bunlar SALSİL®'in hafif yan etkileridir.

*Eğer kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.*

#### **SALSİL®'in saklanması**

*SALSİL®'i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.*

25 °C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız. Ateş, alev ve sıcaktan uzak tutunuz.

#### **Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız**

*Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra SALSİL®'i kullanmayınız.*

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz SALSİL®'i kullanmayınız.

#### ***Ruhsat Sahibi:***

Embil İlaç Sanayii Ltd. Şti.

Maslak Mah. Sümer Sok. Ayazağa Ticaret Merkezi No:3/1 Şişli - İSTANBUL

Tel : 0212 365 93 30

Faks : 0212 286 96 41

E-posta : [info@embil.net](mailto:info@embil.net)

#### ***Üretici:***

Embil İlaç Sanayii Ltd. Şti.

Merkez Mahallesi Birahane Sokak No: 28 Şişli/İSTANBUL

*Bu kullanma talimatı 03.08.2012 tarihinde onaylanmıştır.*