

KULLANMA TALİMATI

THYROMAZOL tablet

Ağızdan alınır.

Etkin madde: Her bir tablet 5 mg Metil-1-Merkapto-2-İmidazol (Metimazol) içerir.

Yardımcı maddeler: Laktoz, Nişasta, PVP K30, Alkol, Magnezyum Stearat içerir.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

- *Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.*
- *Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*
- *Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.*
- *Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.*
- *Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.*

Bu Kullanma Talimatında :

1. **THYROMAZOL nedir ve ne için kullanılır?**
2. **THYROMAZOL' u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler**
3. **THYROMAZOL nasıl kullanılır?**
4. **Olası yan etkiler nelerdir?**
5. **THYROMAZOL' un saklanması**

Başlıkları yer almaktadır.

1.THYROMAZOL nedir ve ne için kullanılır?

THYROMAZOL, yuvarlak, bir yüzü ortadan çentikli, 50 veya 100 tabletlik blister ambalajlarda sunulur.

THYROMAZOL, tiroid bezinin fazla çalıştığı durumlarda kullanılmaktadır.

2. THYROMAZOL' u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

THYROMAZOL' u aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ:

- THYROMAZOL' un bileşimindekilerden herhangi birine karşı oluşmuş aşırı duyarlılık hallerinde kullanmayınız.
- Gebelik ve emzirme döneminde kullanmayınız.

THYROMAZOL' u ařađıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ:

Karaciđer hastalıđınız var ise doktorunuzu bilgilendiriniz. Karaciđer enzimleri normalin 3 katı ve üzerine çıkan hastalarda tedavi kesilmelidir.

Kan hücrelerinde ciddi azalma, ateř, bođaz ađrısı, bařađrısı, deri döküntüleri veya genel durumda bozulma gibi belirtiler ortaya çıktığında doktorunuza bařvurunuz.

THYROMAZOL kullanan hastalarda kanamaya yatkınlık olabileceđi için cerrahi müdahale öncesinde hastalar iyi deđerlendirilmelidir.

“Bu uyarılar geçmiřteki herhangi bir dönemde dahi olsa, sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danıřınız.”

THYROMAZOL' un yiyecek ve iecek ile kullanılması

THYROMAZOL' ün yiyecek ve iecek ile kullanımı hakkında özel uyarı ve önlem bulunmamaktadır.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danıřınız.

Hamilelik döneminde mümkünse bu hastalıđa yönelik diđer ilaların kullanılması daha uygundur.

Tedavi sırasında hamile olduđunuzu fark ederseniz, hemen doktorunuza veya eczacınıza danıřınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danıřınız.

Emziren annelerde kullanılmamalıdır.

Ara ve makine kullanımı

Ara ve makine kullanımına herhangi bir etkisi bildirilmemiřtir.

THYROMAZOL' un ieriđinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

THYROMAZOL, 100 mg laktoz iermektedir. Eđer daha önceden doktorunuz tarafından bazı řekerlere karřı tolerans bozukluđunuz olduđu söylenmiřse, bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geiniz.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

- THYROMAZOL ile, anti-vitamin K aktivitesine bağlı olarak, ağızdan alınan kanın pıhtılaşmasını baskılayıcı ilaçların (oral antikoagülanların) aktivitesinde bir artış görülebilir.
- Varfarinin kanın pıhtılaşması (antikoagülan) etkisini azaltabilir.
- Kodein ve tramadolün (güçlü ağrı kesici ilaçlar) etkisini azaltabilir.
- Bazı kalp ilaçlarını (beta blokerler, digitalis glikozid) kullanan hastalarda da, metimazol kullanımı ile kan tiroid hormonları normale döndüğünde, bu kalp ilaçlarının dozlarının azaltılması gerekebilir.
- Bazı astım ilaçlarını (teofilin) kullanan hastalarda, THYROMAZOL kullanımı ile kan tiroid hormonları normale döndüğünde, astım ilacının vücuttan atılımı azalabileceğinden, bu astım ilacının dozajının azaltılması gerekebilir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise, lütfen doktorunuza veya eczacınıza bu ilaçlar hakkında bilgi veriniz.

3. THYROMAZOL nasıl kullanılır?

- **Uygun kullanım ve doz/ uygulama sıklığı için talimatlar:**

Günlük tedavi dozu olgudan olguya farklılık göstermekle birlikte, genelde (günde) 15- 45 mg arasında değişmektedir. Alacağınız ilaç dozuna hekiminiz karar verecektir.

- **Uygulama yolu ve metodu:**

Hekiminiz tarafından önerilen ilaç dozunu her 8 saatte bir (günde toplam 3 kez), yeterli miktarda sıvı ile aç veya tok karına ağızdan alınız (örneğin, bir bardak su ile). Tabletleri çiğnemeyiniz.

Hastalığınız kontrol altına alındıktan sonra devam tedavisinde dozunuzu sabah kahvaltı sırasında veya sonrasında günde bir kez alınız.

- **Değişik yaş grupları :**

Çocuklarda kullanımı:

Çocuklarda ortalama başlangıç dozu 0,5 mg/kg/gün şeklindedir. Tiroid fonksiyonları normale geldikten sonra doz kademeli olarak indirilir.

Yaşlılarda kullanımı:

Yaşlı hastalarda herhangi bir dozaj ayarlaması bildirilmemiştir.

- **Özel kullanım durumları:**

Böbrek/ Karaciğer yetmezliği:

Karaciğer hastalığınız var ise doktorunuzu bilgilendiriniz. Karaciğer enzimleri normalin 3 katı ve üzerine çıkan hastalarda tedavi kesilmelidir.

Böbrek fonksiyon bozukluğunda dozaj ayarlaması gerekmemektedir.

Eğer THYROMAZOL'un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise, doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla THYROMAZOL kullandıysanız;

THYROMAZOL' den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

THYROMAZOL' u kullanmayı unutursanız;

*THYROMAZOL kullanmayı unutursanız hekiminize danışınız.
Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.*

THYROMAZOL ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

THYROMAZOL tedavisi sonlandırıldığında tiroid hormonunun fazlalığına bağlı yan etkiler ortaya çıkabileceği için, doktorunuzun tavsiyesi doğrultusunda tedaviyi sonlandırınız.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi THYROMAZOL' un içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, THYROMAZOL' u kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

- Soluk almada zorluk
- Yüz, dudak, dil veya boğazda şişme
- Ani kan basıncı düşmesi
- Yaygın ve şiddetli kızarıklık, kaşıntı, kurdeşen (ürtiker)

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin THYROMAZOL' e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi, oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

- Soluk almada zorluk
- Sık enfeksiyona yakalanma
- Normalden daha fazla kanamaya yatkınlık

*Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.
Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.*

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

- Ateş
- Sarılık
- Vücutta şişkinlik
- Baş ağrısı
- Baş dönmesi
- Uyuşukluk hali
- Depresyon
- Bulantı, kusma, karın ağrısı
- Kabızlık
- Kilo artışı
- Eklem ağrısı
- Deri döküntüsü
- Kaşıntı

Bunlar THYROMAZOL' un hafif yan etkileridir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etkiyle karşılaşırsanız, doktorumuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

5. THYROMAZOL' un saklanması

THYROMAZOL' u, çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25 °C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra THYROMAZOL' u kullanmayınız.

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz, THYROMAZOL' u kullanmayınız.

Ruhsat sahibi:

İbrahim Hayri Barut Vereseşi
Reşitpaşa Mahallesi Eski Büyükdere Cad. No:4 34467
Maslak / Sarıyer / İstanbul
Tel: (0212) 366 84 00
Faks: (0212) 276 20 20

Üretim Yeri:

Abdi İbrahim İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Sanayi Mahallesi, Tunç Caddesi, No: 3 Esenyurt / İstanbul
Tel: (0212) 622 66 00
Faks: (0212) 623 19 52

Bu kullanma talimatı GG/AA/YYYY tarihinde onaylanmıştır.